

2003年临床医师考试卫生学试题（二）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_14844.htm [B1型题] 以下提供若干组考题，

每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上

将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。A.及时收集完整、准确的资料

B.综合资料 C.计算分析资料，剔除不合格资料 D.设计、收集资料，整理资料，分析资料 E.完整、准确、及时，要有适当的

数量、代表性和对比条件 86.对原始统计资料的要求是 87.

统计工作的前提和基础是 88.统计工作的基本步骤是 A.自由度

B.样本含量 C.理论频数 D.行×列表中格子数的多少 E.实际频

数 89.X²检验中自由度的大小与什么有关 90.X²值分布的形状

取决于 91.抽样误差的大小受到什么影响 A.病例对照研究 B.前瞻性定群研究 C.回顾性定群研究 D.临床试验 E.横断面研究

92. “在甲型肝炎治疗中，我们比较某种中药（第一组）和西药A（第二组）、西药B（第三组）的治疗效果，第一组27例

病人，第二组和第三组分别为23例和28例，结果平均治愈时间±标准差在三组中分别为10.3±5.7天、11.0±8.2天、11.9

±8.2天，血清学检验结果相似。”这一报道是哪类研究 93. “

为研究咖啡与血清总胆固醇、高密度脂蛋白、胆固醇和甘油三脂的联系，我们检查了人群中年龄20-54岁的女性7213人和

男性7368人，结果发现喝咖啡与总胆固醇、甘油三脂水平在两性中都有正向联系，而在女性与高密度脂蛋白、胆固醇水

平呈负向联系。”这一报道是哪类研究 94. “我们对204例晕

厥病人进行随访，发现总死亡率为 $14 \pm 2.5\%$ ，这些晕厥病人中，53例有心血管病史，其死亡率为 $30 \pm 6.7\%$ ；54例无心血管病史，其死亡率为 $12 \pm 4.4\%$ ；另97例病史不明者死亡率为 $6.4 \pm 2.8\%$ 。有心血管病史的晕厥病人显著高于无心血管病史和病史不明的晕厥病人（ $P = 0.02$ ）”。这一报道是哪类研究 A.患病率 B.发病率 C.患病率+发病率 D.相对危险度 E.以上都不是

95.测量流行病学联系的强度为 96.测量发病的危险度为 97.测量疾病的平均病程为 98.测量疾病的公共卫生学意义为 A.健康是每个人的基本权利，是一项全球指标 B.每千名活产婴儿死亡在30以下 C.提供常见病、多发病的全部治疗药物 D.对常见病和外伤的合理治疗 E.至少有5%的国民生产总值用于卫生事业

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com