

考试辅导：执业医师考试外科复习要点七 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022__E8_80_83_E8](https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c22_14872.htm)

[_AF_95_E8_BE_85_E5_c22_14872.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c22_14872.htm) 12. ★★★最有助于诊断的检查是 A.乙肝五项检查 B.腹X片 C.肝功能检查 D.甲胎蛋白升高 B超检查 E.CT检查 答案：D 题解：1、甲胎蛋白（AFP）测定：对诊断肝细胞癌有相对的专一性。有多种测定方法，如AFP对流免疫电泳法持续阳性或定量 $>400\mu\text{g/L}$ ，并能排除其他病因，应考虑为肝细胞癌，进一步作定位诊断。2、B超：首选的检查方法，先进的B超机已能检出直径为1~2cm的小肝癌。3、CT或磁共振成像：诊断价值与B型超声相仿，但费用昂贵。4、选择性腹腔动脉或肝动脉造影检查：能查出直径1cm富于血管的肿瘤，对小肝癌的定位诊断最有价值。

13. ★★★有助于确诊的检查是 A.B超 B.腹部CT C.X线检查 D.肝功能检查 E.肝穿刺针刺细胞等检查 答案：E 题解：癌症的确诊一般都需要病理诊断。女，60岁，排便习惯改变半年，大便次数增多，有时带脓性粘液，偶尔混有血液，便后不适 (14~16共用题干) 14. ★★★最可能的诊断是 A.直肠癌 B.直肠息肉 C.肛瘘 D.内痔 E.肛裂 答案：A 题解：凡成年人出现原因不明的大便习惯（次数和性状）改变，特别是发现粘液血便，均应考虑有无直肠癌可能。15. ★★★确诊依靠的检查是 A.大便常规化验 B.钡剂灌肠检查 C.直肠指检 D.乙状结肠镜取活组织病理检查 E.粪便潜血试验 答案：D 题解：直肠指检：是诊断直肠癌最重要的检查方法。80%的病人可用手指扪到肿瘤。如触及肿块，应注意肿块的部位、形态、大小、范围及指套上有无粘液、脓血等。内窥镜检查：对所有大便

隐血阳性找不到原因，而指检触及肿块的病人，均应做直肠镜或乙状结肠镜检查，并可取肿瘤组织作病理检查以确诊。X线钡剂灌肠：可排出结肠多发癌和息肉病。实验室检查：对中老年病人，大便隐血实验可作为直肠癌的筛选检查。CEA检查对诊断治疗预后均有重要意义。

16. ★★★该患者进行直肠癌手术能否保留肛门主要取决于 A.肿瘤距肛门缘的距离 B.患者的性别、年龄 C.患者胖瘦 D.肿瘤的大小 E.肿瘤占据直肠的周径比

答案：A 题解：根治性手术：是直肠癌的主要的治疗方法。其术式选择应根据肿瘤的部位、大小、活动度及术前排便的控制能力等而定。低位直肠癌（即癌肿下缘距肛门口5厘米以内）需经腹会阴切口行直肠癌根治性手术（Miles手术），并在左下腹作乙状结肠造口（永久性人工肛门）。癌肿距肛门口5厘米以上的中、高位直肠癌，应在确保疗效的基础上，尽量争取保留肛门，以提高病人的生活质量。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com