

临床执业助理医师资格考试模拟试卷和答案(14) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15059.htm 141 . 患者“冠心病心衰”病史3年，经适当治疗目前心率、血压正常，般活动不受限制，日常活动不引起症状，此时心功能分级应是 A . 心功能I级 B . 心功能不全II级 C . 心功能不全 级 D . 心功能不全

级 E , 心功能失代偿期 142 . 男性，患“高血压病”3年。血压160 / 100mmHg，X线示左室扩大，心电图左室肥厚，眼底动脉硬化并少量出血。此叫应诊为 A . 高血压病1级 B . 高血压病2级 C . 高血压病3级 D . 高血压脑病 E . 高血压危象 143

. 患者因剧烈胸痛，休息或含化硝酸甘油后不缓解入院，诊为“急性心梗”。查：心尖部第一心音减弱，可闻及收缩期喀喇音。推测可能出现的情况是 A . 心力衰竭 B . 心包炎 C . 二尖瓣关闭不全 D . 乳头肌功能失调 E . 心脏破裂 144 . 女性，19岁，头昏，乏力，腰痛半年。查体腹部膨隆，移动性浊音阳性，两下肢明显指凹性浮肿。化验：尿蛋白()，红细胞0 ~ 1 / HP，血浆白蛋白22g / L，胆固醇12mmol / L，血肌酐及尿素氮正常。拟诊应考虑 A . 急性肾小球肾炎 B . 慢性肾小球肾炎 C . 过敏性紫癜肾炎 D . 肾病综合征 E . 急性肾盂肾炎

145 . 男性，25岁，3天前体检偶然发现血压150 / 90mmHg，尿蛋白()，红细胞0-1 / HP，查眼底正常。拟诊应考虑 A . 慢性肾炎 B . 高血压病肾损害 C . 隐匿性肾小球疾病 D . 慢性肾盂肾炎 E . 急进性肾炎 146 . 女性，20岁，贫血2年，平时月经量较多，自感乏力，活动后心慌气短，血常规血红蛋白75g / L，红细胞 3×10^{12} / L，网织红细胞0 . 008，用硫酸

亚铁治疗1周后，自觉症状有所改善，血红蛋白无变化，网织红细胞0.036。患者可能的诊断为 A. 急性失血性贫血 B. 营养性巨幼细胞性贫血 C. 缺铁性贫血 D. 再生障碍性贫血 E. 溶血性贫血

147. 女性，20岁，反复鼻出血、牙龈出血1年余，常见皮肤粘膜出血点，自诉月经量过多，肝脾无肿大，血红蛋白80g/L，血小板 $50 \times 10^9 / L$ 。骨髓增生活跃，巨核细胞数增多，颗粒型巨核细胞比例增多：最可能的诊断是 A. 再生障碍性贫血 D. 急性白血病 C. 过敏性紫癜 D. 血小板减少性紫癜合并失血性贫血 E. 骨髓增生异常综合征

148. 女性，30岁，心悸、月经失调2个月。甲状腺I度大，可闻及血管杂音，心律不齐，呈房颤律，最可能的诊断是 A. 风湿性心脏病 B. 植物神经功能紊乱 C. 甲状腺功能亢进症 D. 功能性月经失调 E. 特发性房颤

149. 女性，28岁，妊娠6个月，心悸、乏力、手抖20天，T₃、T₄升高，诊为甲亢。目前治疗适于 A. 他巴唑 B. 手术 C. ¹³¹I放疗 D. 阻滞剂 E. 中止妊娠

150. 男性，30岁，突然昏迷，瞳孔缩小，肌束震颤、大汗，双肺水泡音，血、尿常规正常，可考虑为 A. 肝昏迷 B. 一氧化碳中毒昏迷 C. 中暑 D. 有机磷农药中毒 E. 肺性脑病

151. 女性，40岁，1天前晨起感左耳后疼痛，言语不清，流涎，口角向右侧偏斜，左侧额纹和鼻唇沟消失，左眼不能闭合。诊断应该是 A. 右侧脑血栓 B. 右侧面神经炎 C. 三叉神经麻痹 D. 左侧面神经炎 E. 动眼神经麻痹

152. 女性，25岁，平素健康。于活动时突然出现剧烈头痛、呕吐，并出现全身抽搐一次。查体：神志清楚，无肢体运动功能障碍，脑膜刺激征阳性，最可能的诊断是 A. 脑出血 B. 脑干出血 C. 癫痫大发作 D. 蛛网膜下腔出血 E. 流行性脑脊髓膜炎

153.

女性，32岁，间断发热1个月，无消瘦、贫血，无咳嗽、咳痰、咽痛。查心肺腹无明显阳性体征，但心肌酶升高。肝肾功能轻度异常，尿蛋白()，下列检查更具诊断意义的是 A．血常规 B．血沉 C．肝胆B超 D．肾活检 E．抗核抗体，抗Sm抗体

154．男性，20岁，大学生，因学习紧张患者感失眠、头痛、记忆力下降。常因小事与同学争吵，上课时注意力不集中，昏昏欲睡，体格检查及头颅CT均未见异常，诊断是 A．躁狂抑郁症 B．精神分裂症 C．神经衰弱 D．焦虑症 E．癔症

A3型选择题(155～165题)

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌()，应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。155．应考虑的情况是 A．诊断无误 B．肺内可能合并感染 C．合并肺外结核 D．同时患有其他发热性疾病 E．抗结核药相对不足

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌()，应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。156．该患者需要进行的处置是 A．加用糖皮质激素 B．增加抗结核药物 C．进行其他疾病相关的检查 D．继续目前治疗不变 E．安宫牛黄丸每日一次口服

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌()，应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。157．该患者用药20天后，感觉眩晕，应进行的处置是 A．停用雷米封 B．暂停雷米封、利福平 C．卧床休息，对症治疗 D．停链霉素 E．停乙胺丁醇

女性，70岁，患“风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全”10年，长期口服地高辛。近日出现尿少、周身浮肿、恶心呕吐，频发多源室早、嗜睡、黄视等改变 158．最可能的

诊断是 A . 心衰加重 D . 感染性心内膜炎 C . 肾衰 D . 消化道溃疡 E . 洋地黄中毒 女性，70岁，患“风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全”10年，长期口服地高辛。近日出现尿少、周身浮肿、恶心呕吐，频发多源室早、嗜睡、黄视等改变

159 . 最佳的治疗方案为 A . 抗炎治疗 B . 加大洋地黄用量 C . 纠正肾功能异常 D . 停洋地黄，用苯妥英钠 E . 加用利尿剂

女性，52岁，消瘦、吞咽困难2个月余，伴心悸气短、双下肢浮肿。查：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，第一心音增强，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣第二心音亢进分裂。

160 . 其心脏体征支持 A . 心力衰竭 B . 心律失常 C . 二尖瓣狭窄 D . 三尖瓣狭窄 E . 二尖瓣关闭不全

女性，52岁，消瘦、吞咽困难2个月余，伴心悸气短、双下肢浮肿。查：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，第一心音增强，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣第二心音亢进分裂。

161 . 可初步诊断为 A . 胃癌 B . 重症营养不良 C . 先心病 D . 风心病 E . 冠心病

男性，55岁，反复不规则胃胀痛3年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。

162 . 慢性胃炎活动期判定根据是 A . 粘膜糜烂 B . 粘膜出血 C . 粘膜中性粒细胞增多 D . 粘膜中主要是淋巴细胞浆细胞 E . 粘膜有过形成

男性，55岁，反复不规则胃胀痛3年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。

163 . 临床疑有胃炎引起的上消化道出血，为确诊，合适的诊断方法是 A . 急诊钡透 B . 剖腹探查 C . 急诊胃镜检查 D . 便隐血试验 E . 吞线试验

女性，55岁，高血压20年，不规则服药。某日晨突发头痛，意识不清，30分钟后送到医院。查体：昏迷，血压200 / 120mmHg，双眼向右侧凝视，左足外旋位。

164 . 最可能的诊断是 A . 晕厥 B . 脑出血 C . 脑血栓形成 D . 蛛网膜下腔出

血 E . 心肌梗死 女性 , 55 岁 , 高血压 20 年 , 不规则服药。某日晨突发头痛 , 意识不清 , 30 分钟后送到医院。查体 : 昏迷 , 血压 200 / 120mmHg , 双眼向右侧凝视 , 左足外旋位。 165 . 最可能的病变部位是 A . 右侧脑干 B . 右侧半球表面 B . 幻觉 C . 被害妄想 D . 关系妄想 E . 影响妄想 A2 型选择题 (128 ~ 154 题) 128 . 某人因有机磷农药中毒 , 致使神经纤维末梢释放的乙酰胆碱不能失活而作用加强。患者不会出现的症状是 A . 消化道运动增强 , 腹痛 , 腹泻 B . 瞳孔缩小 , 视力模糊 C . 肌肉震颤 , 抽搐 D . 皮肤干燥 , 无汗 E . 支气管平滑肌收缩 , 呼吸困难 129 . 男性儿童 10 岁 , 身高 1m , 智力低下。应考虑为哪一种内分泌激素分泌障碍 A . 生长激素 D . 甲状腺激素 C . 肾上腺皮质激素 D . 胰岛素 E . 性激素 130 . 女性 , 中年 , 肝炎史多年 , 血清 A / G 倒置 , 因为 A . 肝合成清蛋白减少 B . 清蛋白水解增多 C . 清蛋白从尿中排出 D . 球蛋白合成增多 E . 球蛋白破坏减少 131 . 男性 , 65 岁 , 高血压病史已 20 余年 , 初期时正常时高 , 近 7 8 年不服药已难以降到正常 , 近一年多来出现肾功能不全 , 近一周多前因感冒发烧 , 继发肺部感染 , 感染未能控制 , 今因严重肺感染 , 小叶性肺炎死亡 , 尸检发现双肾呈细颗粒状萎缩 , 组织学上发现肾输入动脉及入球小动脉广泛管壁增厚 , 均匀红染物质沉着 , 管腔狭窄 , 甚至闭塞。这些血管壁的变化是 A . 血管壁淀粉物质沉着 B . 血管壁血清蛋白沉着 C . 血管壁胶原纤维玻璃样变 D . 血管糖原沉着 E . 血管纤维化 132 . 女性 , 60 岁 , 突发腹痛 , 寒战、高烧 , 并出现黄疸 , 诊断为急性胆囊炎 , 宜选用的药是 A . 利福平 B . 四环素 C . 庆大霉素 D . 林可霉素 E . 氨苄西林 133 . 男性 , 45 岁 , 突然呕血 400ml 并伴黑便 , 查

血压13.3 / 9.33 kPa(100 / 70mmHg)，心肺()，可见腹壁静脉曲张，肝未触及，脾于肋下2cm可触及，应首选治疗方法是 A. 静脉注射止血药 B. 静脉推注洛赛克 C. 静脉滴注垂体后叶素 D. 静脉滴注代血浆 E. 冰盐水洗胃 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com