

口腔试题(四)_医师考试模拟题,执业医师,医药学考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E8_AF_95_E9_c22_15086.htm

- 24.成正变关系的是：() A.切与尖 B.尖与补 C.定与补 D.定与尖 E.髁与尖
- 25.成反变关系的是：() A.定与补 B.切与补 C.尖与髁 D.定与切 E.髁与定
- 26.甲基丙烯酸甲酯单体的引发剂是：() A.甲氯基二苯甲酮 B.二叔丁基对甲苯酚 C.邻苯二甲酸二丁酯 D.聚乙酰氨 E.过氧化苯二甲酰
- 27.邻间钩跨越牙的外展隙数是：() A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
- 28.用面部观察法测定垂直距离时应注意：() A.有无下颌前伸习惯 B.息止颌位是否稳定 C.测定颌间距离 D.瞳间线与口角线是否平行 E.以上都不是
- 29.全口义齿平衡咬合各因素中病人所固有的是：() A.髁道斜度 B.切道斜度 C.补偿曲度 D.定位平面斜度 E.牙尖工作斜面斜度
- 30.具有应力中断作用的卡环是：() A.越合卡环 B.对半卡环 C.倒钩卡环 D.正二型卡环 E.铸造回力卡环
- 31.一侧后牙游离缺失,但修复时不与对侧相连的是王忞寿分类的：() A.第一类 B.第二类 C.第三类 D.第四类 E.第五类
- 32.Kennedy第四类设计,模型后倾的主要目的是() A.利用由前向后倾斜的就位道 B.制作方便 C.争取有利的固位条件 D.减少义齿基托与余留前牙的间隙 E.以上都不是
- 33.双侧磨牙缺失拟用舌杆,牙槽嵴呈倒凹形,安放舌杆的位置是：() A.与粘膜轻轻接触 B.根据义齿设计类型决定 C.与粘膜有0.5毫米间隙 D.位于非倒凹区 E.以上均不是
- 34.上前牙缺失,可摘义齿戴入后,基托前后翘动,常见的原因是：() A.塑料填塞期选择不当 B.基托伸展过长 C.基托过薄 D.弯制卡环时模型被磨损 E.未设置卡环

转贴于：100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com