

执业医师考试常见记忆知识点总结 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E7_c22_15172.htm 血红Pr150~220g/L红C男：4~5.5女3.5~5.0 出生时5~7白C：成人4~10 儿15~20 早产6~8 生后3~10天10~12白C减少症：成人<4 儿童<10岁者<5 >10岁者<4.5中性粒：0.5~0.7 儿0.65 单核C：0.03~0.08 淋巴：0.2~0.4 儿0.35中性粒C减少症：成人<2 儿<10岁者<1.5 10岁者<1.8粒C缺乏症：<0.5血小板：100~300，<100减少，>400增多，儿以中性C为主，4~7天后以淋巴C为主，200~3002~3个月生理性贫血：红C $3 \times 10^{12}/L$ ，血红Pr110g/L 中性粒与淋巴C4~6天、4~6岁时相等 出血时间（BT）1~3分 凝血（CT）4~12分，<4高凝，>12低凝血块回缩1/2~1h，24h内完成血清碱性磷酸酶（ACP）成人<40~110u/L，儿童<250u/L足月儿血容量50~100ml/kg，早产儿89~105胆红素：1.7~17.1 结合胆红素（CB）：3.42 非结合胆红素：13.68黄疸胆红素：>34.2 隐性黄疸胆红素：17.1~34.2钾3.5~5.5 钙2.25~2.75 镁0.7~1.1 磷0.96~1.62 钠135~147 氯95~105pH：7.35~7.45 <7.35失代酸 >7.45失代碱 阴道pH正常值：4.5 尿pH5~7，比重1.011~1.025，渗透压500~800管型尿>500个/12h镜下血尿：>3个或计数>50万肉眼血尿：出血>1mlPr尿：>150mg/日 大量Pr尿：>3.5g/1.73m²/日或50mg/kg/日 正常12h尿白C<5个，<100万，管型<5000个 生后首次排尿可延迟36h，尿量为400~500，幼儿500~600，学龄前600~800，学龄期800~1400少尿：婴幼儿<200，学龄前<300，学龄期<400无尿<30~50每日能量：碳水化合物16.7kJ（4kcal），脂

肪37.7 (9) , Pr质16.7 (4) < 1岁每日每公斤体重需460kJ , 以后每3岁 - 42kJ (10) , 15岁时209~251kJ (50~60) 每天Pr质3~3.5g/kg , 脂肪婴幼儿4~6g/kg , > 6岁2~3g/kg , 碳水化合物12g/kg , 水120~150ml/kg能量多来自碳水化合物糖类来源 : 谷类、根茎类、食糖维生素分为脂溶性 (A、D、E、K) 、水溶性 (B、C) 围生期 : 28周胎龄 (体重 1000g) 到产后7天 , 死亡率高婴儿期 : 28天到满1岁 , 生长发育最快 , 5~6个月对传染病的免疫力低幼儿期 : 1~3岁 , 易发生意外伤害中毒 , 智力发育最快足月儿血压9.3/6.724h内排胎便 , 3~4天排完 , 早产儿排出延迟早产儿易发生低血糖和低Pr血症 , 晚期代酸 , 率快 , 血压低体重1~6月 = 体重 月龄 \times 0.25 3~5个月 = 2 \times 体重 7~12个月 = 6 月龄 \times 0.25 2~12岁 = 年龄 \times 2 7 (8) 1岁时3倍 , 2岁时4倍个体体重差异 \pm 10% 身高1岁75 , 2岁时85 , < 30% 为异常2~12岁身高 = 年龄 \times 7 70上部量 : 指头顶至耻骨联合上缘下部量 : 指耻骨联合上缘到足底12岁时上部量 = 下部量头围新生儿34 , 6个月44 , 1岁46 , 2岁48 , 5岁50胸围32 , 生时胸 < 头1~2 , 1岁头 = 胸 , 1岁到青春前期 = 年 - 1上臂围 < 5岁者 : > 13.5营养良好 , 12.5~13.5中等 , < 12.5不良小儿收缩压 = 年 \times 2 80 , 舒张压 = 2/3 \times 收1~9岁腕部骨化中心 = 年 1 , 10岁出全10个生后4~10个月乳牙共20个 , 最晚2.5岁出齐 < 2岁乳牙 = 月 - 4~6岁出现第一磨牙 , 12岁第二磨牙 , 18岁第三磨牙恒牙总数28~32个前凶 : 对边中点连线长度 , 出生1.5~2 cm , 1~1.5岁闭合 , 早闭或过小见于小头畸形。迟闭或过大见于佝偻病、呆小病。饱满见于颅内压 、 脑炎、脑膜炎、脑积水、脑肿瘤。凹陷见于极度消瘦或脱水转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

