

执业助理模拟考题第五套（第一单元）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15248.htm A1型题目(1-73题) 答案说明 每道试题由一个题干和五个备选答案组成。五个备选答案中只有一个是最佳答案，其余均不完全正确，要求选出正确的那个答案。

1 下列哪项不是ARDS的病因：A: 感染性休克 B: 溺水 C: 急性坏死性胰腺炎 D: 阻塞性肺气肿 E: 败血症

2 妇科常见的三大恶性肿瘤是：A: 外阴癌子宫颈癌卵巢癌 B: 子宫颈癌子宫内膜癌卵巢癌 C: 子宫内膜癌输卵管癌卵巢癌 D: 卵巢癌外阴癌输卵管癌 E: 卵巢癌子宫颈癌输卵管癌

3 子宫颈癌最早出现的症状是：A: 尿频尿急 B: 接触性出血 C: 进行性下肢肿痛 D: 大量米汤样恶臭白带 E: 绝经后长期阴道出血

4 关于子宫肌瘤，下列描述正确的是：A: 肌壁间肌瘤最多见 B: 肉瘤变多见 C: 黏膜下肌瘤一般不突向子宫腔 D: 不会影响生育 E: 一般不出现疼痛

5 妇科常用的对卵巢功能的特殊检查方法，不包括：A: 宫颈刮片检查 B: 宫颈黏液检查 C: 基础体温测定 D: 子宫内膜检查 E: 阴道脱落细胞检查

6 对急性胎儿窘迫的描述，错误的是：A: 心率高于160次/分或低于120次/分 B: 早期胎动频繁 C: 羊水中出现胎粪 D: 后期胎心音增强 E: 胎儿头皮血测定pH值低于7.20

7 羊水过多最常见的原因是：A: 双胎妊娠 B: 胎儿畸形 C: 妊娠并发糖尿病 D: 母儿血型不合 E: 妊娠高血压综合征

8 关于不全流产的临床表现，下列错误的是：A: 妊娠8周以前，出现阴道流血与剧烈腹痛 B: 妊娠8~12周，阴道流血较多 C: 流产的主要症状是阴道流血和腹痛 D: 妇科检查子宫口松弛或有胎盘组织堵塞 E: 子宫小于停经月份

9

关于恶露的描述，错误的是：：A: 产褥期经阴道排出的含血液、坏死组织、黏液和细菌的分泌物，称为恶露 B: 血性恶露含大量血液、血小板及坏死蜕膜组织 C: 浆液性恶露含血液较少，有较多的子宫颈分泌物及阴道排液 D: 白色恶露含大量白细胞、退化蜕膜、表皮细胞及细菌 E: 正常恶露可以持续2~3各月

10 在第三产程，胎盘剥离的征象不包括：：A: 再次出现明显腹痛 B: 子宫体变硬呈球形 C: 阴道少量出血 D: 阴道外露的一段脐带自行延长 E: 手掌尺侧压耻骨联合上方子宫体上升而脐带不再回缩

11 关于胎产式的描述，错误的是：：A: 胎体纵轴与母体纵轴的关系称为胎产式 B: 两轴平行的为纵产式 C: 两轴垂直的为横产式 D: 两轴交叉成角的为斜产式 E: 斜产式为暂时的，在分娩过程中多转为横产式。

12 早孕出现最早及最重要的症状是：：A: 停经史 B: 恶心呕吐 C: 尿频 D: 乳房胀痛 E: 腹痛

13 最有产科价值的女性骨盆出口平面的径线是：：A: 前后径 B: 横径 C: 前矢状径 D: 后矢状径 E: 以上均不是

14 风湿性心内膜炎最常受累的瓣膜是：：A: 二尖瓣 B: 三尖瓣 C: 主动脉瓣 D: 肺动脉瓣 E: 三尖瓣和肺动脉瓣

15 A 病史 B OT试验 C 胸部X线检查 D 周围血象变化 E 脑脊液检查：A: 病史 B: OT试验 C: 胸部X线检查 D: 周围血象变化 E: 脑脊液检查

16 肾病综合征病理生理的改变以哪项为主：A: 全身高度浮肿 B: 低蛋白血症 C: 大量蛋白尿 D: 高胆固醇血症 E: 以上均不是

17 婴儿生理性贫血的时间是出生后：：A: 1个月 B: 2~3个月 C: 4~6个月 D: 7~9个月 E: 10个月后

18 小儿重型腹泻与轻型腹泻的主要区别点是：：A: 发热、呕吐的程度 B: 腹泻，每日10余次 C: 大便蛋花样，混有黏液 D: 大便镜检有大量脂肪球 E: 有水及电解质紊乱

19 不是导致小儿腹泻病的内在因素的是：：A: 消化

系统发育不成熟 B: 消化道负担过重 C: 肠道内感染 D: 血中免疫球蛋白及胃肠道分泌型IgA低 E: 胃内酸度低 20 4 : 3 : 2 (2 / 3张) 混合液的组成是 : A: 4份10% 葡萄糖、3份生理盐水、2份1.4%碳酸氢钠 B: 4份生理盐水、3份10% 葡萄糖、2份5%碳酸氢钠 C: 4份5% 葡萄糖、3份生理盐水、2份5%碳酸氢钠 D: 4份生理盐水、3份5% 葡萄糖盐水、2份11.2%乳酸钠 E: 4份生理盐水、3份5% 葡萄糖、2份1.4%碳酸氢钠 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com