

临床执业医师资格考试题库及答案（妇儿科第二部分）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15272.htm 妇产科学、儿科学模拟试题（二）[A1型题]以下每一考题以下有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 骨盆界线的组成是A. 耻骨联合下缘、髂耻缘和骶岬下缘的连线B. 耻骨联合下缘、髂耻缘和骶岬上缘的连线C. 耻骨联合上缘、髂嵴和骶岬下缘的连线D. 耻骨联合上缘、髂嵴和骶岬上缘的连线E. 耻骨联合上缘、髂耻缘和骶岬上缘的连线
2. 当由于卵巢肿瘤而发生蒂扭转的时候，其扭转的蒂的组成是A. 子宫圆韧带、输卵管B. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢韧带C. 骨盆漏斗韧带、输卵管和卵巢固有韧带D. 骨盆漏斗韧带、输卵管和子宫圆韧带E. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢固有韧带
3. 下列哪一项是青春期开始的重要标志A. 第一性征的发育B. 第二性征的出现C. 月经初期D. 卵泡发育E. 出现周期性排卵
4. 下列哪一项是雌激素的生理作用A. 使子宫内膜由增生期转化为分泌期B. 增强子宫收缩力，增加子宫平滑肌对催产素的敏感性C. 加快阴道上皮细胞脱落D. 使宫颈口闭合，粘液减少，变稠，拉丝度减少E. 通过中枢神经系统有升温作用
5. 正常月经周期的妇女，其宫颈粘液呈典型的羊齿状结晶是在月经周期的A. 第6~7日B. 第8~10日C. 第11~12日D. 第13~14日E. 第15~20日
6. 卵子从卵巢排出后，正常的受精部位是A. 输卵管峡部B. 输卵管峡部与壶腹部连接处C. 输卵管壶腹部D. 输卵管间质部E. 宫腔内
7. 孕妇妊娠后期子宫增生速度最快

的部分是A．子宫底部B．子宫体部C．子宫下段D．子宫颈E．子宫各部的增长速度基本相同8．对早期妊娠的诊断中，下列各项最准确的是A．自觉胎动B．停经伴恶心、呕吐C．阴道充血变软，显紫蓝色D．B型超声检查见妊娠环及环内可见有节律的胎心搏动E．子宫增大9．Hegar征是指A．阴道壁及宫颈充血，呈紫蓝色B．宫径变软，子宫峡部根软，感觉宫颈与宫体似不相连C．子宫前后径变宽，宫体呈球形D．乳头增大变黑，乳晕变黑，乳晕上的皮脂腺肥大形成散在的结节状小隆起E．子宫呈前倾前屈位10．先兆临产是指A．规律宫缩、宫口扩张、见红B．规律宫缩、胎儿下降感、见红C．假临产、胎儿下降感、见红D．假临产、宫口扩张、见红E．宫口扩张、胎儿下降感、见红11．先兆流产的特点是A．阴道流血较多，腹痛剧烈B．宫颈口扩张，胚胎组织堵塞于宫颈口内C．妊娠已部分排出体外D．宫颈口未开，阴道少量流血E．阴道流血，子宫小于停经月份12．过期妊娠是指A．平时月经周期规律，妊娠达到38周仍未临产B．妊娠达到39周仍未临产C．平时月经周期规律，妊娠达39周仍未临产D．平时月经周期规律，妊娠达42周仍未临产E．平时月经周期规律，妊娠达40周仍未临产13．胎头的最大径线是A．双顶径B．双额径C．枕颞径D．枕额径E．枕下前凶径14．母子血型不合引起胎儿溶血是下列哪种抗体A．IgAB．IgEC．IgMD．IgDE．IgG15．最常见的异常胎位是A．持续性枕后位B．高直径C．臀先露D．肩先露E．面先露16．在产褥感染中，下列哪种细菌感染最易引起菌血症A．溶血性链球菌B．大肠杆菌属C．脆弱类杆菌D．金黄色葡萄球菌E．厌氧性球菌17．滴虫性阴道炎临床治愈的标准是A．临床症状如外阴瘙痒、泡沫状

白帶增多等消失B. 滴虫检查阴性C . 治疗后滴虫检查阴性十
十月经后复查阴性1次D . 治疗后滴虫检查阴性十月经后复查2
次均阴性E . 治疗后滴虫检查阴性十三次月经后复查均阴性18
 . 为确诊有无衣原体感染 , 下列哪项检查最敏感A . 组织培
养法B . 免疫学方法检测局部衣原体抗原C . 聚合酶链反应
法(PCR)D . 分解物涂片找包涵体E . 以上均不是19 . 目前世
界上发病率最高的性传播疾病是A . 淋病B . 生殖器疱疹C .
梅毒D . 尖锐湿疣E . 获得性免疫缺陷综合征20 . 下列各种方
法中最常用来普查筛检宫颈癌的是A . 子宫颈刮片细胞学检
查B . 碘试验C . 宫颈锥切术D . 阴道镜检查E . 宫颈和宫颈管
活组织检查

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com