

临床执业医师资格考试题库及答案（卫生学第一部份）PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_15274.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15274.htm)

第一单元卫生学模拟试题(一)[A1型题]以下每一考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 医学统计的研究内容是A. 研究样本B. 研究个体C. 研究变量之间的相关关系D. 研究总体E. 研究资料或信息的收集、整理和分析

2. 总体应该由A. 研究对象组成B. 研究变量组成C. 研究目的而定D. 同质个体组成E. 个体组成

3. 在统计学中，参数的含义是A. 变量B. 参与研究的数目C. 研究样本的统计指标D. 总体的统计指标E. 与统计研究有关的变量

4. 计算相对数的目的是A. 为了进行显著性检验B. 为了表示绝对水平C. 为了便于比较D. 为了表示实际水平E. 为了表示相对水平

5. 相对数使用时要注意以下几点，其中哪一项是不正确的A. 比较时应做假设检验B. 离散程度和变异程度C. 不要把构成比当率分析D. 二者之间的可比性E. 分母不宜过小

6. 抽样误差的定义为A. 总体参数与总体参数间的差异B. 个体值与样本统计量间的差异C. 总体参数间的差异D. 样本统计量与总体统计量间的差异E. 样本统计量之间的差异

7. 在统计学中，定性因素是指A. 定性指标B. 计量资料C. 计数资料D. 等级资料E. 变量

8. 抽样误差是指A. 总体参数与总体参数间的差异B. 个体值与样本统计量间的差异C. 总体参数间的差异D. 样本统计量与总体统计量间的差异E. 以上都不对

9. 做频数表时，以组距为5，下列哪项组段划分正确A. 0—，5—

, 10— , ...B . 05 , 5—10 , 10— , ...C . —5 , —10 , —15 ,  
 ...D . 04 , 59 , 10— , ...E . 5— , 7— , 9— , ...10 . 用变异系数比较变异程度适用于A . 相同指标 , 均数相差较大B . 不同指标 , 均数相差较小C . 不同指标 , 均数相差较大D . 相同指标 , 标准差相差较大E . 以上均不是11 . 中位数与四分位数间距适用于A . 正态分布资料B . 偏态分布资料C . 正偏态资料D . 负偏态资料E . 对称分布资料12 . 均数与标准差之间的关系是A . 标准差越小 , 均数代表性越大B . 标准差越小 , 均数代表性越小C . 均数越大 , 标准差越小D . 均数越大 , 标准差越大E . 标准差越大 , 均数代表性越大13 . 正态分布是以A . T值为中心的频数分布B . 参数为中心的频数分布C . 变量为中心的频数分布D . 观察例数为中心的频数分布E . 均数为中心的频数分布14 . T值的分布A . 正偏态分布B . 负偏态分布C . 近似正态分布D . 正态分布E . 偏态分布15 . 变异系数表示A . 变异数B . 对称分布C . 集中趋势D . 相对变异E . 平均水平16 .  $\bar{X} \pm 2 . 58s$ 包括变量值的A . 68 . 3%B . 80 . 0%C . 90 . 0%D . 95 . 0%E . 99 . 0%17 . 均数与标准差适用于A . 正偏态分布B . 负偏态分布C . 正态分布D . 偏态分布E . 不对称分布18 . 原始数据加或减一个不等于0的常数k , 则19 . 某数列1 , 3 , 5 , 6 , 3 , 描述这5个数的大小 , 用什么指标较合适A . 均方根B . 标准差C . 中位数D . 几何均数E . 均数20 . 标准正态分布曲线下 , 中间90%的面积所对应的横轴尺度u的范围是A .  $-1 . 645 \sim +1 . 645$ B .  $-X \sim +1 . 282$ C .  $-1 . 282 \sim +1 . 282$ D .  $-X \sim +1 . 645$ E .  $-2 . 326 \sim +2 . 326$

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)