

外科知识辅导：直肠癌术后化疗具体方案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E7_9F_A5_E8_c22_15313.htm 直肠癌术后化疗共8个疗程 第一疗程,术后病人进食量可二便正常 一般为术后 15天左右 化疗期 5天 第二疗程,第一次化疗结束的3到4周后 第三疗程,第二次化疗结束的3到4周后 第四疗程,第三次化疗结束的3到4周后 第五疗程,第四次化疗结束的3到4周后 第六疗程,第五次化疗结束的3月后 第七疗程,第六次化疗结束的6月后 第八疗程,第七次化疗结束的1年后 具体化疗方案: 第一组:10%糖500 VC 3.0 VB60.3 甲氰咪胍 0.6 第二组: 5%糖500 亚叶酸钙0.2 第三组:格瑞同50MI 第四组:5%糖500 5-F 0.75 静点 1/日 共5天 第3到4天时可 0,9%盐1000 顺铂 60MG 地米10MG 利多500MG 丝裂霉素 8MG 腹腔灌注一次 本方案以正常中年人 60MG左右体重计算 化疗中如患者对药物反应较轻 转贴于: 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com