

执业助理模拟考题第四套（第二单元）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15317.htm A1型题目(1-74题) 答案

说明 每道试题由一个题干和五个备选答案组成。五个备选答案中只有一个是最佳答案，其余均不完全正确，要求选出正确的那个答案。

1 诊断阻塞性肺气肿最有价值的检查是：A: 心电图 B: 胸部X线 C: 肺功能 D: 动脉血气分析 E: 胸部超声波

2 最易引起单侧胸腔积液的病因：A: 结核性胸膜炎 B: 化脓性胸膜炎 C: 膈下脓肿 D: 充血性心力衰竭 E: 肺癌

3 哮喘重度发作伴窦性心动过速哪项治疗是错误的：A: 鼻导管吸氧 B: 吸入沙丁胺醇 C: 普萘洛尔口服 D: 吸入异丙托溴铵 E: 静滴氢化考的松琥珀酸钠

4 ARDS与心源性肺水肿最主要鉴别是：A: 呼吸困难与体位有关 B: 肺底有罗音 C: 紫绀程度 D: 肺毛细血管楔压 E: 有无心脏疾病史

5 对临床怀疑肺结核的病人最主要的检查是：A: PPD试验 B: 血沉 C: 痰结核菌检查 D: 胸部CT E: 结核抗体测定

6 洋地黄中毒可出现下列心电图变化，但哪项表现不常见：A: 室上速伴II度房传导阻滞 B: 窦性心动过速伴QRS增宽 C: III度房室传导阻滞 D: 室早二联律 E: 心房颤动

7 下列情况应停用洋地黄，但除外：A: 室早二联律 B: 色觉异常 C: 恶心、呕吐 D: 房速伴不完全性房室传导阻滞 E: 心电图ST段斜形下移

8 心脏骤停是指心脏：A: 自律功能降低 B: 传导功能降低 C: 收缩功能减弱 D: 射血功能减弱 E: 心室充盈受碍

9 缺少下列哪项就不能诊断恶性高血压：A: $DBP > 12.9kPa(130mmHg)$ B: 中度高血压可急剧发展为恶性高血压 C: 重度高血压可急剧发展为恶性高血压 D: 眼底可有出血渗出和乳头水肿 E: 眼底无乳头水肿

10 下列哪项对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值：A: 血清脂肪酶增高 B: 血清淀粉酶增高 C: 血钙降低 D: 血胆红素增高 E: B超或CT检查胰腺增大，轮廓边界模糊不清

11 急性胰腺炎患者，下述指标提示预后不良，但哪项除外：A: 血尿淀粉酶异常升高 B: 血钙降低 C: 血清蛋白降低 D: 低氧血症（动脉氧分压 E: 长时间持续休克

12 下列哪项表现不符合急性心包炎有心包积液液体液：A: 心音低沉 B: 心界普遍扩大 C: 肝肿大 D: 心尖搏动明显 E: 呼吸困难

13 复合性溃疡常是：A: 胃溃疡先于十二指肠溃疡出现 B: 十二指肠溃疡先于胃溃疡出现 C: 十二指肠溃疡愈合后才出现胃溃疡 D: 十二指肠愈合并胃炎后才出现胃汤 E: 十二指肠溃疡合并胃炎后才出现胃溃疡

14 慢性萎缩性胃炎有哪种情况应考虑胃溃疡：A: 经内科治疗一个月症状未完全缓解 B: 伴有假幽门腺化生 C: 胃酸分泌量偏低 D: 血清胃泌量偏低 E: 胃粘膜有重度异型增生

15 治疗暴发型溃疡性结肠炎的首选方法为：A: 大剂量抗胆碱能药物 B: 水杨酸偶氮磺胺吡啶 C: 大剂量肾上腺糖皮质激素 D: 免疫抑制剂 E: 手术治疗

16 判断慢性胃炎是否属活动性的病理依据是：A: 幽门螺杆菌感染的程度 B: 粘膜糜烂的程度 C: 脓性分泌物的多少 D: 粘膜充血水肿的程度 E: 粘膜有无中性细胞浸润

17 关于结肠憩室病，下列哪项是正确的：A: 大于60岁的人很少患此病 B: 结肠憩室多发于粗食，多谷物饮食者 C: 憩室炎造成单个憩室局部穿孔 D: 憩室病主要见于肥胖者和贫困地区 E: 结肠憩室通常发生于右侧结肠和盲肠部

18 肥厚性梗阻性心肌病：A: 二尖瓣前叶活动曲线呈“城垛样”图形 B: 室间隔与左室厚度之比2.1:1 C: 左心室扩大并呈弥漫性搏动减弱，二尖瓣开放呈菱形改变 D: 二尖瓣上有赘生物 E: CD段呈吊床样心肌病

19 肉眼血尿反复发作

，最常见于：A: 急性肾小球肾炎 B: 狼疮性肾小球肾炎 C: 急进性肾小球肾炎 D: 过敏性紫癜肾炎 E: IgA肾病 20 下列哪项不是再生障碍性贫血的有效治疗方法：A: 雄激素 B: 环孢菌素 C: 骨髓移植 D: 抗淋巴细胞球蛋白 E: 集落刺激因子 转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com