

泌尿外科主治医师职称考试模拟试题(二) PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_8C\\_E5\\_B0\\_BF\\_E5\\_A4\\_96\\_E7\\_c22\\_15403.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_B3_8C_E5_B0_BF_E5_A4_96_E7_c22_15403.htm)

52．阴茎癌的主要淋巴转移部位是 A 腹股沟淋巴结 B 盆腔淋巴结 C 腹主动脉旁淋巴结 D 会阴部淋巴结 E 髂血管旁淋巴结

53．青年男性中死于恶性肿瘤以下列哪种肿瘤为最常见 A 膀胱肿瘤 B 前列腺癌 C 睾丸肿瘤 D 肾癌 E 肾胚胎癌

54．下列哪种情况下可出现睾丸鞘膜积液 A 睾丸肿瘤 B 附睾炎 C 睾丸外伤 D 原发病因不明 E 以上都对

55．关于排泄性尿路造影在诊断膀胱癌的价值，下列哪项是错误的 A 了解双肾功能 B 有否因膀胱肿瘤引起的上尿路梗阻 C 有否合并肾盂癌及输尿管癌 D 根据膀胱内充盈缺损，初步估计肿瘤大小及部位 E 可确定膀胱肿瘤浸润深度

56．关于慢性移植肾肾病、肾硬化病及慢性钙神经蛋白抑制剂肾中毒的鉴别诊断，下列哪项正确 A 前三者最显著的特点为动脉病理改变 B 动脉正常提示为慢性钙神经蛋白抑制剂肾中毒 C 中、重度的动脉纤维化为肾移植肾病 D 动脉有高血压样变化为慢性肾移植肾病 E 以上都正确

57．男，9岁，因腰腹疼痛就诊，排尿可，有恶心、呕吐，经当地医院检查诊断为先天性肾盂输尿管交界处狭窄，右肾积水。查体：右腰腹肿块，有波动感，无压痛。尿常规化验正常。肾图示右肾呈梗阻曲线，功能中度受损，右肾正常。根据临床表现及检查应采取何种治疗措施 A 肾部分切除 B 肾切除 C 肾造瘘 D 肾盂输尿管成形 E 无需治疗

58．尿道炎时尿痛的特点 A 排尿开始时出现疼痛 B 排尿终时尿痛加重 C 常伴有尿线中断 D 伴有耻骨上区疼痛 E 伴有终末血尿

59．精索静脉曲张可导致精子数量减少

，活动力减低，其解释为 A 阴囊温度增高 B 辜丸温度增高 C 左精索静脉反流到辜丸的血含肾上腺皮质类固醇及代谢产物对辜丸生精功能的抑制 D 辜丸组织缺氧 E 附辜组织缺氧 60 . 对先天性肾盂输尿管交界处狭窄最具确诊意义的检查是 A 同位素肾图 B 肾动脉造影 C IVP或逆行造影 D B超 E 皮肾穿刺造影 61 . 确诊前列腺癌最可\*的方法是 A 直肠指检 B B超 C PSA测定 D 血清酸性磷酸酶测定 E 活体组织检查 62 . 异位辜丸最通常的位置是 A 会阴部 B 骨盆中 C 股部（在股三角） D 腹股沟管表面（在腹外斜肌的表面） E 阴茎部 63 . 运动性血尿的特点 A 血尿程度与运动量无关 B 血尿常伴有其他症状 C 血生化、肾功能及X线检查可能出现异常 D 一般持续一周 E 是一种局限的良性过程，预后良好 64 . 关于尸体供肾的绝对禁忌证，下列哪项正确 A 热缺血时间大于20分钟 B HIV阳性 C 年龄 > 70岁 D 转移性恶性肿瘤 E 以上全是 65 . 在尿流率测定的各项参数中，下列哪项最有意义 A 最大尿流率 B 平均尿流率 C 排尿时间 D 尿流时间 E 尿量 66 . 尿道造影时患者一般采用何种体位 A 正位 B 侧位 C 斜位 D 卧位 E 平卧位 转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)