

中医儿科知识点辅导：时行疾病顿咳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E5_84_BF_E7_c22_15439.htm

【概述】1. 定义 顿咳是由时行疫邪引起的呼吸道传染病。临床以咳嗽逐渐加重，继而有阵发性痉挛性咳嗽，咳毕有特殊的鸡啼样吸气性吼声，病程可拖延2~3月以上为主要特征。2. 发病情况 发病季节 一年四季均可发生，以冬春两季为多见。 发病年龄 任何年龄均可发病，但以5岁以下小儿最多见，新生儿亦易患病。 传染源及传播途径 病人是唯一的传染源（包括典型、非典型、轻型），通过空气飞沫传播。 免疫力 自然感染不能提供终生免疫，菌苗接种后，若超过12年，发病率达50%，与同年龄组未经菌苗接种者相同。 预后 主要取决于发病年龄和有无并发症。婴幼儿可因严重窒息致死或留下神经系统后遗症。严重的呼吸道并发症和百日咳脑病预后较差。3. 命名 在历代医家文献中有顿嗽、天哮、顿呛、鹭鸶咳等名称。4. 范围 相当于西医学所称之“百日咳”。【病因病机】1. 病因 外感时行疫邪，内为肺气不足。2. 病机 时行疫邪首先犯肺，继而郁滞化热，痰热互结，深伏肺之气道，肺失清肃，气冲上逆。【临床表现】1. 潜伏期 3~21天，大多7~14天。2. 前驱期 指从发病至阵发性痉挛性咳嗽出现，一般为7~10天。此期可有低热、咳嗽、打喷嚏、流泪、乏力等症状。3. 痉咳期 持续约2~6周，亦可长达2个月左右。临床特点为成串的，接连不断的痉挛性短咳后咳嗽暂停，伴一次深长的吸气，此时产生一种特殊的高音调鸡啼样吸气性吼声。如此反复多次，直至咳出大量粘稠痰液或把胃内容物吐出

为止。幼婴和新生儿可不出现痉咳而发生呼吸暂停，出现深度紫绀或发生抽搐。4. 恢复期一般持续2~3周。阵发性痉咳的次数减少，鸡啼样吸气声消失，咳嗽终止时不伴呕吐。

【诊断】 1. 发病前1~3周有百日咳接触史，而无疫苗接种史；2. 典型的临床表现：前驱期中咳嗽日见加重，痉咳期中典型的阵发性痉挛性咳嗽，伴吸气性鸡啼样吼声；新生儿或幼婴儿表现为阵发性屏气、紫绀发作。3. 实验室检查白细胞总数和淋巴细胞明显增高。

【类证鉴别】 1.咳嗽：多由感受风热或风寒之邪所致，多伴鼻塞、流涕、发热等症、无痉咳发生，经治表证解后，咳嗽渐止，病程较短。2.支气管异物：突然发生阵发性痉咳，有异物吸入史。转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com