

中医儿科知识点辅导：时行疾病风痧 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E5_84_BF_E7_c22_15448.htm

【概述】 1. 定义 风痧是感受风热时邪引起的急性肺系时行疾病。以轻度发热，咳嗽，皮肤出现淡红色斑丘痧，耳后及枕部核肿大为特征。

2. 发病情况 [发病季节] 一年四季都可发病，常在冬春引起流行。 [发病年龄] 多发生于1~5岁小儿，病后可获持久性免疫。 [传染途径和流行情况] 主要是飞沫传染。在出痧前、中、后数天传染性最强，患病后可获终身免疫。

3. 预后 预后一般良好，恢复较快，但邪热炽盛，也可内传气营或迫伤营血而导致重证。 注意：孕妇妊娠早期患本病，可传给胎儿，导致流产、死胎，或引起先天性心脏病、白内障、智能低下等，影响胎儿正常发育。

【病因病机】 1. 病因 病因为感受风热时邪。 2. 病机 主要病机为邪毒与气血相搏，外泄肌肤所致。风热时邪从口鼻而入，郁于肺卫，蕴于肌腠，与气血相搏，邪毒外泄，发于皮肤所致。邪轻病浅，一般只伤肺卫，故可见恶风，发热，咳嗽，流涕等症，皮疹色泽浅红，分布均匀。若邪毒炽盛，内传入里，燔灼气营，或迫伤营血，则可见壮热，烦渴，尿赤，便秘等症，皮疹鲜红或深红，疹点分布较密。邪毒与气血相搏，阻滞于少阳经络，则发为耳后及枕后核肿大。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com