

临床执业医师资格考试药理学模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_15481.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15481.htm) [A1型题] 以下每一考

题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。 1

．半数致死量(LD50)是指 A．能使群体中有半数个体出现某一效应的剂量 B．能使群体中有50个个体出现某一效应的剂量 C．能使群体中有一半个体死亡的剂量 D．能使群体中有一半以上个体死亡的剂量 E．以上说法均不对 2．副作用是指

A．与治疗目的无关的作用 B．用药量过大或用药时间过久引起的 C．用药后给病人带来的不舒适的反应 D．在治疗剂量出现与治疗目的无关的作用 E．停药后，残存药物引起的反应 3．下列受体与其激动剂搭配正确的是 A． 受体—肾上腺素 B． 受体—可乐定 C． M受体—烟碱 D． N受体—毛果芸香碱 E． 1受体—异丙肾上腺素 4．有关阿托品的各项叙述

，错误的是 A．阿托品可用于各种内脏绞痛 B．可用于治疗前列腺肥大 C．对中毒性痢疾有较好的疗效 D．可用于全麻前给药以制止腺体分泌 E．能解救有机磷酸酯类中毒 5． 受体阻断剂一般不用于 A．心律失常 B．心绞痛 C．青光眼 D．高血压 E．支气管哮喘 6．下列用于镇静催眠最好的药是 A．地西洋 B．氯氮草 C．巴比妥类 D．苯妥英钠 E．奥沙西洋 7

．左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于 A．脑膜炎后遗症 B．乙型肝炎 C．肝性脑病 D．心血管疾病 E．失眠 8．临床上不把保泰松作为抗风湿首选药，是因为 A．保泰松抗风湿作用较弱 B．保泰松造价昂贵 C．保泰松的蛋白结合率

太低 D . 保泰松的不良反应多且严重 E . 以上说法均不对 9 . 下列哪个是阿片受体的特异性拮抗药 A . 美沙酮 B . 纳洛酮 C . 芬太尼 D . 曲马朵 E . 烯内吗啡 10 . 对强心甙中毒引起的重症快速型心律失常，可用哪种药治疗 A . 阿托品 B . 利多卡因 C . 戊巴比妥 D . 地西洋 E . 苯妥英钠 11 . 钙离子通道有四种亚型，哪种不对 A . L型 B . S型 C . N型 D . T型 E . P型 12 . 有关可乐定的叙述，错误的是 A . 可乐定是中枢性降压药 B . 可东定可用于治疗中度高血压 C . 可乐定可用于治疗重度高血压 D . 可乐定可用于治疗高血压危象： E . 可乐定别称氯压定 13 . 硝普钠主要用于 A . 用于高血压危象 B . 用于中度高血压伴肾功能不全； C . 用于重度高血压 D . 用于轻、中度高血压 E . 用于中、重度高血压 14 . 心律失常发生的机制是 A . 心肌兴奋过度导致异常 B . 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常 C . 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常 D . 潜在起搏点搏动频率加快 E . 以上说法均不对 15 . 下列不能用于治疗心律失常的是 A . 奎尼丁 B . 普萘洛尔 C . 维拉帕米 D . 氢氯噻嗪 E . 胺碘酮 转贴于： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)