

执业医师考试外科复习要点二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15502.htm 23 . 最有效的治疗是

A.长期抗甲状腺药物治疗 B.手术治疗 C.放射治疗 D.甲状腺素治疗 E.中医治疗答案：B 题解：双侧甲状腺大部切除术治疗

是公认的最有效的甲亢治疗方法。 24 . 甲状腺手术后1天，

病人手足抽搐时处理的方法是立即 A.测定血清钙浓度 B.口服钙剂 C.口服二氢速固醇 D.静脉注射10%葡萄糖酸钙10~20ml

E.行甲状旁腺移植术答案：D 题解：手足抽搐发生率约8%，因术中误伤及甲状旁腺或引起其血液供给受累所致，严重时

(罕见)膈肌也可痉挛引起窒息而死；甲状旁腺损伤出现手足抽搐。发作时立即静脉注射10%葡萄糖酸钙或氯化钙10

~20ml。口服双氢速变固醇能明显提高血中钙含量。 女性，29岁，哺乳期，右侧乳房胀痛2天，发热 39℃，体格检查：

右乳房肿胀，内象限有压痛，有波动感。(25~27共用题干) 25 .

首先应该考虑什么疾病 A.炎性乳房癌 B.肋软骨炎 C.乳房皮肤感染 D.乳房囊性增生 E.急性乳腺炎答案：E 题解：根据

哺乳妇女，尤其是初产妇、乳头发育不良(过小或内陷)、乳汁过多、乳管欠通畅的妇女，患乳出现红、肿、痛、热感染征象，全身感染中毒症状较重，应首先考虑急性乳腺炎。

若脓肿形成，有波动感(浅表脓肿)或明显压痛(深处脓肿)，穿刺抽出脓液，即可确定诊断。 26 . 根据以上情况应该采取下列哪种措施 A.手术切除右乳房 B.预防性应用抗生素

C.切开皮肤引流 D.排空乳汁消除乳汁淤积 E.局部热敷加物理治疗答案：C 题解：治疗愈早，效果愈好。形成脓肿前须积

极控制感染，形成脓肿后应及早切开引流。非手术疗法：用乳罩托起乳房。暂停哺乳，以吸乳器吸尽乳汁；不要轻易断乳，仅感染过重或有乳痿形成方宜口服乙烯雌酚1~2mg，3次/日，共2~3日，或肌注苯甲酸雌二醇2mg，每日1次至完全断乳。局部热敷、理疗。全身选用有效抗生素，青霉素80万U溶于0.5%普鲁卡因20ml左右作乳房后封闭及病灶周围注射，每日或隔日1次。适当休息，加强营养。

27. 1周以后，右乳房疼痛范围扩大，伴发热39℃以上，寒颤，体格检查：右乳房红肿热痛明显，压痛及波动感，穿刺出脓性液体。应做什么治疗 A.切开引流 B.单纯性右乳房切除 C.抗生素治疗 D.中药治疗 E.物理治疗 答案：A 题解：治疗愈早，效果愈好。形成脓肿前须积极控制感染，形成脓肿后应及早切开引流。

三、以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(28~31题共用备选答案) A.饮水呛咳 B.声音低钝 C.手足抽搐 D.声音嘶哑 E.失音

28. 喉返神经一侧损伤：答案：D 题解：喉上神经损伤内侧支被误伤，饮流质时误咽而至呛咳。外侧支损伤，可出现声调变低。喉返神经损伤：一侧损伤，出现声嘶；两侧损伤，可至失音或严重呼吸困难。

29. 喉返神经两侧损伤：答案：E

30. 喉上神经内侧支被误伤：答案：A

31. 喉上神经外侧支损伤：答案：B

普外2一、以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 关于股疝的叙述不正确的是 A.腹腔内

脏经股环、股管，从卵圆窝突出转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com