

临床执业医师资格考试题-妇儿科-1_医师考试模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15509.htm 以下每一考题以下有A

、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 骨盆界线的组成是 A. 耻骨联合下缘、髂耻缘和骶岬下缘的连线 B. 耻骨联合下缘、髂耻缘和骶岬上缘的连线 C. 耻骨联合上缘、髂嵴和骶岬下缘的连线 D. 耻骨联合上缘、髂嵴和骶岬上缘的连线 E. 耻骨联合上缘、髂耻缘和骶岬上缘的连线

2. 当由于卵巢肿瘤而发生蒂扭转的时候，其扭转的蒂的组成是 A. 子宫圆韧带、输卵管 B. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢韧带 C. 骨盆漏斗韧带、输卵管和卵巢固有韧带 D. 骨盆漏斗韧带、输卵管和子宫圆韧带 E. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢固有韧带

3. 下列哪一项是青春期开始的重要标志 A. 第一性征的发育 B. 第二性征的出现 C. 月经初期 D. 卵泡发育 E. 出现周期性排卵

4. 下列哪一项是雌激素的生理作用 A. 使子宫内膜由增生期转化为分泌期 B. 增强子宫收缩力，增加子宫平滑肌对催产素的敏感性 C. 加快阴道上皮细胞脱落 D. 使宫颈口闭合，粘液减少，变稠，拉丝度减少 E. 通过中枢神经系统有升温作用

5. 正常月经周期的妇女，其宫颈粘液呈典型的羊齿状结晶是在月经周期的 A. 第6~7日 B. 第8~10日 C. 第11~12日 D. 第13~14日 E. 第15~20日

6. 卵子从卵巢排出后，正常的受精部位是 A. 输卵管峡部 B. 输卵管峡部与壶腹部连接处 C. 输卵管壶腹部 D. 输卵管间质部 E. 宫腔内

7. 孕妇妊娠后期子宫增生速度最快的部分是 A. 子宫底部 B.

· 子宫体部 C . 子宫下段 D . 子宫颈 E . 子宫各部的增长速度基本相同 8 . 对早期妊娠的诊断中，下列各项最准确的是 A . 自觉胎动 B . 停经伴恶心、呕吐 C . 阴道充血变软，显紫蓝色 D . B型超声检查见妊娠环及环内可见有节律的胎心搏动 E . 子宫增大 9 . Hegar征是指 A . 阴道壁及宫颈充血，呈紫蓝色 B . 宫径变软，子宫峡部根软，感觉宫颈与宫体似不相连 C . 子宫前后径变宽，宫体呈球形 D . 乳头增大变黑，乳晕变黑，乳晕上的皮脂腺肥大形成散在的结节状小隆起 E . 子宫呈前倾前屈位 10 . 先兆临产是指 A . 规律宫缩、宫口扩张、见红 B . 规律宫缩、胎儿下降感、见红 C . 假临产、胎儿下降感、见红 D . 假临产、宫口扩张、见红 E . 宫口扩张、胎儿下降感、见红 11 . 先兆流产的特点是 A . 阴道流血较多，腹痛剧烈 B . 宫颈口扩张，胚胎组织堵塞于宫颈口内 C . 妊娠已部分排出体外 D . 宫颈口未开，阴道少量流血 E . 阴道流血，子宫小于停经月份 12 . 过期妊娠是指 A . 平时月经周期规律，妊娠达到38周仍未临产 B . 妊娠达到39周仍未临产 C . 平时月经周期规律，妊娠达39周仍未临产 D . 平时月经周期规律，妊娠达42周仍未临产 E . 平时月经周期规律，妊娠达40周仍未临产 13 . 胎头的最大径线是 A . 双顶径 B . 双额径 C . 枕颈径 D . 枕额径 E . 枕下前凶径 14 . 母儿血型不合引起胎儿溶血是下列哪种抗体 A . IgA B . IgE C . IgM D . IgD E . IgG 15 . 最常见的异常胎位是 A . 持续性枕后位 B . 高直径 C . 臀先露 D . 肩先露 E . 面先露 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com