

临床执业医师资格考试题库及答案（外科第二部分）— PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15525.htm 以下每一考题以下有A

、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 等渗性脱水病人，如大量输入生理盐水治疗可导致 A. 低氯血症 B. 低钙血症 C. 低钾血症 D. 高钾血症 E. 高氯血症

2. 人体酸碱平衡的调节主要依* A. 泌尿系统调节固定酸 B. 血液缓冲系统 C. 呼吸系统排出挥发酸 D. 以上三者共同作用 E. 肾素—血管紧张素—醛固酮系统和抗利尿激素的共同作用

3. 下列哪一个选项为低钾区别于高钾的心电图表现 A. QT间期延长 B. U波 C. QT间期缩短 D. QRS增宽 E. 以上均不是

4. 关于补钾原则，下列哪种说法正确 A. 补钾的浓度宜低于0.3% B. 补钾的速度一般不宜超过20mmol/h C. 每日补钾量不宜超过100~200mmol D. 每小时尿量超过40ml后，再从静脉输给氯化钾溶液 E. 以上各项均对

5. 下列哪一项为自体输血的适应证 A. 胸、腹腔开放性损伤，超过4小时以上者 B. 合并阻塞性肺部疾病、肝肾功能不全或原有贫血者 C. 脓毒血症或菌血症者 D. 异位妊娠破裂 E. 凝血因子缺乏者

6. 造成休克死亡的最主要的原因是 A. 呼吸困难综合征 B. 急性心肌梗塞 C. 急性肾功能衰竭 D. 脑疝 E. 急性肝功能衰竭

7. 在休克监测中，哪项观察结果表示预后极差甚至死亡率可达100% A. 中心静脉压低于0.49KPa B. 肺动脉楔压超过4.0KPa C. 乳酸盐浓度超过8mmol/L D. 动脉二氧化碳分压高于5.33KPa E. 血小板计数低于 $8.0 \times 10^{10}/L$

8. 如未发生休克

，休克指数应是 A . 0 . 1 B . 0 . 5 C . 1 . 0 D . 1 . 5 E . 2 . 0 9 . 在心肺复苏过程中，如发生阵发性室性心动过速，宜首选 A . 肾上腺素 B . 阿托品 C . 氯化钙 D . 利多卡因 E . 碳酸氢钠 10 . 下列哪一个手术属于择期手术 A . 脾破裂 B . 乳癌根治术 C . 嵌顿疝 D . 绞窄疝 E . 胃溃疡的胃大部切除术 11 . 下列各项感染中，哪一种属于特异性感染 A . 大叶性肺炎 B . 肝脓肿 C . 唇痈 D . 新生儿皮下坏疽 E . 肺结核球 12 . 下列哪一项是深部脓肿的特点 A . 局部隆起 B . 有波动感 C . 在疼痛区的某一部位可出现凹陷性水肿 D . 有红、肿、热、痛的典型症状 E . 与正常组织分界清楚，压之剧痛 13 . 引起甲沟炎的常见致病菌为 A . 金黄色葡萄球菌 B . 溶血性链球菌 C . 大肠杆菌 D . 真菌 E . 产气荚膜杆菌 14 . 下列哪一个特点是革兰氏染色阴性杆菌败血症的特点 A . 主要致病菌是金黄色葡萄球菌 B . 感染性休克发生早，持续时间长 C . 热型为稽留热或弛张热 D . 常可见转移性脓肿 E . 并发心肌炎较多见 15 . 下列哪种伤口属于清洁伤口 A . 腹股沟疝修补术切口 B . 胸部被砍伤后9小时的伤口 C . 头面部撞伤14小时的伤口 D . 胃大部切除术的切口 E . 脓肿切开引流的伤口 转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com