

执业医师考试内科模拟试题十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15574.htm 56 . 男，20岁，在一次

体检中发现HBsAg阳性，当时无自觉症状及体征，肝功能正常。次年5月，因突然乏力、恶心、厌食、尿黄而入院。化验

：ALT500u,血清总胆红素85 $\mu\text{mol/L}$ ，抗HAVIgM()。该患者的诊断可能为 2001 A . 乙型肝炎，慢性迁延型，既往感染过甲型肝炎 B . 乙型肝炎，慢性活动型，既往感染过甲型肝炎 C . 急性甲型黄疸型肝炎，乙型肝炎病毒携带者 D . 急性乙型肝炎，合并甲型肝炎 E . 急性黄疸型肝炎，甲、乙型肝炎病毒混合感染 本题正确答案：C

57 . 女，50岁，反复低热1年，伴四肢大小关节肿痛。WBC $8.0 \times 10^9 / \text{L}$ ，Hb100g / L，ANA(-)，RF()。经多种抗生素正规治疗无效，可能的诊断是 2000 A . 风湿性关节炎 B . 系统性红斑狼疮 C . 骨关节炎 D . 类风湿关节炎 E . 结核菌感染引起的关节炎 本题正确答案

：D 58 . 血红素合成障碍所致的贫血是 2002 A . 缺铁性贫血 B . 再生障碍性贫血 C . 海洋性贫血 D . 巨幼细胞贫血 E . 慢性病贫血 本题正确答案：A

59 . 男，50岁。被发现昏倒在煤气热水器浴室内。查体：浅昏迷，血压160 / 90mmHg，口唇樱红色，四肢无瘫痪，尿糖()，尿酮体(-)，最可能的诊断是

2001 A . 脑出血 B . 脑梗塞 C . 急性心肌梗死 D . 急性一氧化碳中毒 E . 糖尿病酮症酸中毒 本题正确答案：D

60 . 氰化物中毒时，病人的呼吸气味可呈 2002 A . 烂苹果味 B . 蒜臭味 C . 腥臭味 D . 酒味 E . 苦杏仁味 本题正确答案：E

61 . 原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是 2003 A . 持续性高血

压 B . 血钠潴留过多 C . 持久尿量过多 D . 尿钾排出增多 E . 血钾浓度降低 本题正确答案 : E

62 . 甲型肝炎病程中 , 传染性最强的阶段是 2003 A . 潜伏期 B . 黄疸前期 C . 黄疸期 D . 恢复期 E . 慢性期 本题正确答案 : B

63 . 男 , 46岁 , 右颈部无痛性淋巴结肿大4个月 , 伴上腹疼痛 , 食欲不佳 , 发热、盗汗、体重减轻。行剖腹探查见胃与胰头及腹膜有粘连 , 周围有多个肿大的淋巴结 , 病理检查为非霍奇金淋巴瘤 , T细胞来源。临床分期属 2001 A . IIB B . AC . BD . AE . B 本题正确答案 : E

64 . 肝硬化消化道出血 , 伴高血压冠心病患者 , 下列止血措施中最不恰当的是 2000 A . 三腔二囊管压迫 B . 去甲肾上腺素胃管滴注 C . 垂体后叶素静脉滴注 D . 6-氨基己酸静脉滴注 E . 冰生理盐水洗胃 本题正确答案 : C

65 . 男性 , 32岁 , 因口服敌敌畏重度中毒1小时入院 , 经阿托品 . 氯磷定等各项治疗3天后神志清醒 , 中毒症状缓解 , 体征消失 , 再用阿托品口服维持6天后 , 查全血胆碱酯酶活力仍处于80%左右 , 究其原因 , 最可能是 2002 A . 系高毒类毒物中毒 B . 胃、肠、胆道内仍有残毒在吸收 C . 用解毒药剂量不足 D . 肝脏解毒功能差 E . 红细胞再生尚不足 本题正确答案 : B

66 . 类风湿关节炎(RA)病人中可以查到类风湿因子(RF) , 因此RF 2003 A . 是诊断RA的必备条件 B . 一旦出现 , 将不会发生改变 C . 可随疾病的变化而变化 D . 正常人不会出现 E . 在其他自身免疫病中不会出现 本题正确答案 : C

67 . 有关糖皮质激素治疗溃疡性结肠炎的说法中 , 正确的是 2003 A . 柳氮磺胺吡啶治疗无效时应用激素治疗效果亦差 B . 特别适合于重型活动性溃疡性结肠炎 C . 不可用于灌肠治疗 D . 不可与柳氮磺胺吡啶联合治疗 E . 可以作为试验性治疗用于溃疡性

结肠炎的鉴别诊断 本题正确答案：B 68 . 女，22岁，因服吲哚美辛数片后觉上腹痛，今晨呕咖啡样胃内容物400ml来诊。既往无胃病史。首选的检查是 2001 A . 血清胃泌素测定 B . B型超声检查 C . X线胃肠钡餐检查 D . 急诊胃镜检查 E . 胃液分析 本题正确答案：D 69 . 男，44岁，头晕、乏力、面色苍白3年。巩膜轻度黄染，脾肋下2cm。血红蛋白56g / L，红细胞 $1.8 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $2.2 \times 10^9 / L$ ，血小板 $32 \times 10^9/L$ 。骨髓增生减低，但红系增生，以中、晚幼红为主，尿Rous试验()，Ham试验()首先考虑 2001 A . 缺铁性贫血 B . 巨幼细胞贫血 C . 再生障碍性贫血 D . 阵发性睡眠性血红蛋白尿 E . 自身免疫性溶血性贫血 本题正确答案：D 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com