

《外科学》辅导：外科感染治疗方面汇总 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E3_80_8A_E5_A4_96_E7_A7_91_E5_c22_15640.htm 一 总的治疗原则消除感

染的病因，清除脓液、坏死组织，增加病人的抗感染与修复能力，是治疗外科感染的原则。 局部治疗 1.患部制动与休息：有利于炎症局限化和消肿，减轻疼痛。 2.外敷药物：消肿、止痛。 3.热敷、理疗或放射疗法：消肿、止痛、杀菌、消炎。 4.外科疗法：包括脓肿的切开引流和发炎脏器的切除。

二 分类叙述 (一)疔：以局部治疗为主，但有时也需全身应用抗菌药物。而疔病一般均需辅以抗菌药物。 疔在早期未溃时切忌挤压。可作热敷，或外敷药膏。已有脓头尚未破溃者可作切开引流或药线引流，但面部疔应尽量避免作切开。(二)痈：

1.充分休息、加强营养，使用镇静剂，合理选用敏感的抗菌药物。 2.局部早期可用金黄膏、50%硫酸镁或70%酒精湿敷。 3.较小的痈在早期经上述处理后，坏死组织脱落，伤口可逐渐愈合外，大部分痈都因病变范围较大，医学教育网原创引流不畅，感染不易控制而需作切开引流术。 切开一般用“+”、“++”或“川”形切口。切口应超出炎症范围少许，深达筋膜，尽量剪除坏死组织。(三)急性蜂窝织炎治疗 1.可用50%硫酸镁溶液湿热敷或金黄膏外敷局部。也可作紫外线或超短波治疗。 2.一般需同时应用磺胺药或抗生素。 3.一旦形成脓肿，应行切开引流。(四)新生儿皮下坏疽治疗 1.新生儿的免疫功能较差，如不及时和积极治疗，本病可以并发败血症、支气管炎和肺脓肿等。 2.诊断一旦明确，即应作多处切口引流，切口一般约需作57处，每个切口约长1cm.经过此种

处理，病变常可得到控制。3.如有坏死出现，应随时将坏死皮肤切除。4.术后应经常换药，保持引流通畅；必要时。在创面清洁后作植皮术。5.全身应用青霉素等抗菌药物和加强全身支持疗法。(五)丹毒治疗：休息，抬高患肢。局部用50%硫酸镁湿热敷或用抗菌药物软膏外敷。全身应用抗菌药物。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com