

执业医师外科模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15653.htm 32 . 男性，42岁，患急性重症胰腺炎并发休克36小时，经抗休克治疗后行胰腺和其周围坏死组织清除．腹腔引流术。术后心率106次/分，血压12.8 / 8kPa(96 / 60mmHg)，中心静脉压10cmH₂O，呼吸频率22次/分，动脉血氧分压11.5kPa(86mmHg)，尿量10ml / 小时，尿比重1.002，此病人目前最紧急的并发症是 2002 A . 心功能不全 B . 肺功能衰竭 C . 肾功能衰竭 D . 血容量不足 E . 体内抗利尿激素分泌过多 本题正确答案：C

33 . 小脑幕切迹疝最有意义的临床定侧体征是 2000 A . 患侧肢体活动减少或消失 B . 对侧腹壁反射消失 C . 患侧瞳孔散大 D . 对侧肢体腱反射亢进 E . 患侧下肢病理反射 本题正确答案：C

34 . 对心力衰竭病人进行择期手术，至少待心衰控制以后 2000 A . B . 1~2周 C . 3~4周 D . 5~6周 E . >6周 本题正确答案：C

35 . 小脑幕切迹疝最有意义的临床定侧体征是 2001 A . 患侧肢体活动减少或消失 B . 对侧腹壁反射消失 C . 患侧瞳孔散大 D . 对侧肢体腱反射亢进 E . 患侧下肢病理反射阳性 本题正确答案：C

36 . 临床上最常见的输血反应是2001 A . 非溶血性发热反应 B . 变态反应 C . 过敏反应 D . 溶血反应 E . 细菌污染反应 本题正确答案：A

37 . 低钾血症的病人，补钾后病情仍无改善时，应首先考虑缺乏 2001 A . 镁 B . 磷 C . 钠 D . 氯 E . 钙 本题正确答案：A

38 . 免疫性非溶血性发热性输血反应的主要原因和发病机制是 2002 A . 输入血液中的白细胞和患者血浆中的白细胞抗体发生免疫反应 B . 输入血液中的红细

胞和患者血浆中相应抗体发生免疫反应 C . 输入血液中的血小板和患者血浆中相应抗体发生免疫反应 D . 输入血液中的血浆蛋白在患者体内引起过敏反应 E . 输入血液中污染的热原质导致发热性反应 本题正确答案 : A 39 . 最能减少输血的并发症且无传染疾病危险的是 2000 A . 输新鲜血 B . 输新鲜冰冻血浆 C . 输浓缩红细胞 D . 输白蛋白制剂 E . 自体输血 本题正确答案 : E 40 . 病理改变在肾脏 , 临床表现为膀胱刺激症状 , 最常发生此种情况的泌尿系疾病是 2000 A . 肾肿瘤 B . 鹿角型肾结石 C . 肾损伤 D . 泌尿系结核 E . 肾积水 本题正确答案 : D 41 . 疝手术病人入院时血压 150 / 96mmHg , 针对此血压值正确的处理是 2003 A . 术前用降压药 B . 术前不用降压药 C . 术中用降压药 D . 术后不用降压药 E . 术前术后均用降压药 本题正确答案 : B 42 . 初期复苏的任务和步骤可归纳为 ABC , 其含义是 2002 A . 触大动脉确诊 进行人工呼吸 建立人工循环 B . 保持呼吸道通畅 进行人工呼吸 建立人工循环 C . 保持呼吸道通畅 建立人工循环 进行人工呼吸 D . 心肺复苏 药物治疗 脑复苏 E . 低温 脱水 皮质激素治疗 本题正确答案 : B 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com