

执业医师《内科学》辅导：干性支气管扩张 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15676.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15676.htm)

问题：女性，25岁，既往健康，突然咯血约500ml。查体：心肺未见异常，胸X线片双肺下野纹理增粗（问题）你认为诊断应是 A.急性支气管炎 B.支气管扩张症 C.支气管内膜结核 D.支气管肺癌 E.急性肺梗死

请问为什么？ 答案及解析：故本题选B。 干性支气管扩张：在支气管扩张症中，部分病例由于首先咯血而就诊，经X线胸片或肺高分辨率CT检查而发现本病；此类患者平时无慢性咳嗽、大量脓痰等症状，主要表现为反复咯血。急性支气管炎多有咳嗽、咳痰等上呼吸道感染病史，支气管内膜结核应有结核感染的相应表现，如低热、盗汗、乏力等。支气管肺癌医学教育原创早期症状不明显，若出现较大量的咯血，胸片可能可见肿块影。急性肺梗死的临床表现较重，多有显著的胸痛，呼吸困难等正常支气管造影肺炎合并右肺支管扩张/肺炎合并双下肺支气管扩张转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)