

2004年临床执业医师资格考试试题及参考答案（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_2004\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_15705.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_15705.htm)

- 290.易发生蒂扭转的卵巢囊肿是（答案：A） A.皮样囊肿 B.巧克力囊肿 C.粘液性囊腺瘤 D.浆液性囊腺癌 E.滤泡囊肿
- 291.最常见的子宫肌瘤类型是（答案：A） A.肌壁间肌瘤 B.浆膜下肌瘤 C.粘膜下肌瘤 D.宫颈肌瘤 E.阔韧带肌瘤
- 292.子宫肌瘤发生红色样变常见于（答案：A） A.妊娠期 B.月经中期 C.绝经前期 D.红斑狼疮治疗期 E.生育期
- 293.子宫内膜癌的诊断方法应是（答案：E） A.细胞学图片 B.磁共振成像 C.血清CA125测定 D.淋巴造影 E.分段诊刮
- 294.完全性葡萄胎的恶变率，国内外报道有异，我国为（答案：B） A.10.5% B.14.5% C.20.5% D.30.5% E.35%
- 295.最常见的子宫内膜异位症病灶部位在（答案：B） A.子宫肌层 B.卵巢 C.宫颈 D.直肠子宫陷凹 E.宫底韧带
- 296.应用高效孕激素和假孕疗法治疗子宫内膜异位症效果较差的是（答案：E） A.卵巢巧克力囊肿 B.子宫直肠陷凹病灶 C.膀胱的子宫内膜异位 D.远处转移的子宫内膜 E.子宫肌腺病
- 297.关于带铜V型宫内节育器，错误的是（答案：D） A.是我国常用的宫内节育器之一 B.其形状更接近宫腔形态 C.带器妊娠率低 D.出血发生率低 E.脱落率低
- 298.输卵管绝育术的作用是（答案：C） A.抑制排卵 B.杀灭精子 C.阻止精子与卵子相遇 D.降低宫颈粘液的粘稠度 E.降低精子存活率
- 299.生后第一年身高增长约（答案：E） A.35cm B.32cm C.30cm D.27cm E.25cm
- 300.出生时新生儿的头围约（答案：B） A.35cm B.34cm C.33cm D.32.5cm E.31cm
- 301.1~2岁幼儿1年中身高约增长（答案：C） A.5cm B.7cm

C.10cm D.12cm E.13cm 302.恒牙骨化开始的年龄是（答案：A）  
A.新生儿 B.1岁 C.2岁 D.3岁 E.4岁 转贴于：100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)