

执业医师《内科学》辅导：急性肺脓肿的抗生素治疗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15710.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15710.htm)

问题：急性肺脓肿抗菌治疗的疗程是 A.4~6周 B.6~8周 C.8~12周 D.12~16周 E.16~20周 请问是B还是C？谢谢！！ 答案及解析：本题选C。急性肺脓肿的抗生素治疗一般为8-12周，直到临床症状完全消失，胸部X线片显脓腔及炎性病变完全消失，仅残留少量条索状纤维阴影。在有效抗生素治疗下，体温约3-7天可下降，7-14天可降至正常。3-10天内痰恶臭消失。临床症状改善后抗生素静脉滴注可改为口服。医学教育网

<http://www.med66.com> 相关内容 lung abscess的感染细菌包括革兰氏阳性球菌和大多数厌氧菌都对青霉素敏感，疗效较佳。

因此经验性治疗首选青霉素，根据病情每日静滴240万-1000万U，严重感染者可用2000万U/天。对于厌氧菌感染可采用青霉素 林可霉素（1.8-2.4g/d）或克林霉素（0.6-1.8g/d）或甲硝唑（1.0-1.5g/d），分2-3次静脉滴注。疗效不佳时，根据细菌培养的药物敏感试验选择合适的抗生素。在全身用药的基础上，可加用抗生素局部治疗（气道内或气管内滴药。）滴药后按脓肿的部位，采用合适的体位，静卧一小时。医转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)