

临床执业助理医师考试各科容易出错题目(外科)1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15749.htm 一、以下每一道题下面

有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

23. 进行性血胸特点不包括 A.反常呼吸运动 B.胸腔内压进行性增高 C.静脉压升高，心搏微弱、动脉压降低 D.呼吸时的纵隔扑动 E.胸腔引流血量 $>200\text{ml/h}$ ，连续3h 您所选的答案

: D 本题正确答案: B 题解 被屏蔽的广告: 进行性血胸有如下临床表现: 脉搏逐渐加快、血压持续下降。 输血补液后，血压不回升，或暂时升高很快又降低。 红细胞计数、血红蛋白、血细胞比容进行性减少。 偶因积血凝固，胸膜腔穿刺虽无所发现，但 线检查显示胸膜腔阴影越来越大。

胸膜腔闭式引流血量，持续3小时超过 200ml/h 。 25.

哪一项不是动力性泌尿系梗阻的常见原因 A.腰麻和肛管直肠术后 B.中枢和周围神经系统疾病 C.前列腺增生 D.阿托品服用 E.低血钾、高热等 您所选的答案: D 本题正确答案: C 题解

: 机械性梗阻: 膀胱颈部和尿道的任何梗阻性病变，都可以引起急性尿潴留。较常见的如前列腺增生、尿道损伤和尿道狭窄。尿道狭窄急性尿潴留常在尿道扩张后由于局部水肿和疼痛而诱发。膀胱或尿道的结石、肿瘤、异物等堵塞膀胱颈和尿道，膀胱肿瘤引起的膀胱内大量凝血块，盆腔肿瘤，妊娠子宫，处女膜闭锁的阴道积血，甚至婴幼儿直肠内的粪块都可能是急性尿潴留的原因。动力性梗阻: 膀胱、尿道并无器质性梗阻病变，尿潴留系排尿功能障碍所引起，如麻醉、

手术后尿潴留，特别是腰麻和肛管直肠手术后。中枢和周围神经系损伤、炎症、肿瘤等亦可引起急性尿潴留。各种松弛平滑肌的药物如阿托品、普鲁本辛、654-2偶有引起急性尿潴留者。各种原因引起的低血钾可使膀胱逼尿肌无力，发生排尿困难甚至尿潴留。也常见于高热、昏迷的病人，在小儿与老人尤为多见。个别病人因不习惯于卧床排尿而发生尿潴留。

41. 嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是 A.疝囊有无压痛 B.疝内容物能不能回纳 C.疝内容物有无血运障碍 D.是否有休克 E.是否有机械性肠梗阻的表现 您所选的答案：B 本题正确答案：

C 题解：嵌顿性疝：当腹内压突然增高，疝内容物被强行挤过狭小的疝环而被卡住不能还纳腹腔时，称为嵌顿性疝。

绞窄性疝：指嵌顿性疝又伴发血循环障碍者。46. 关于气性坏疽的早期诊断不正确的是 A.肌肉丰富部位严重的损伤 B.伤后3天左右局部出现异乎寻常的疼痛，红、热不明显，而肿胀发展迅速 C.伤口流出黑色恶臭血性液体，周围皮肤有捻发音 D.伤口内渗出液涂片发现大量白细胞，革兰阳性粗大杆菌很少 E.X线摄片显示肌群间存在气体 您所选的答案：A 本题

正确答案：D 题解：伤口内渗出液涂片发现大量革兰阳性粗大杆菌、白细胞很少。47. 关于加用碘剂对甲状腺大部切除术患者手术前用药的叙述不正确的是 A.碘剂的作用是减少术中出血，便于手术操作 B.常用制剂为复方碘溶液（卢戈液） C.每日3次，每次3~5滴，以后逐日每次增加1滴，至每次15滴 D.一般约4周（不宜超过8周） E.凡不准备施行手术治疗的患者，一律不要服用碘剂 您所选的答案： 本题正确答案：

D 题解：药物准备的方法通常有三种： 甲亢症状较重者，先服用抗甲状腺药物，症状控制后停药改服碘剂； 甲亢

症状较轻者可单用碘剂准备； 对抗甲状腺药物不能耐受或疗效不好的患者，常用制剂为复方碘溶液（卢戈液），一般约2周（不宜超过6周）。凡不准备施行手术治疗的患者，一律不要服用碘剂。可以手术的指标是病人情绪稳定、睡眠好转、体重增加；脉率 < 90 次/分；基础代谢率 $< 20\%$ ；甲状腺腺体变硬缩小。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com