

临床执业医师考试各科容易出错题目(内科)5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15760.htm 201 . 下列哪项

血脂异常不是冠状动脉粥样硬化的危险因素 A.总胆固醇（TC）升高 B.甘油三酯（TG）升高 C.低密度脂蛋白（LDL）升高 D.极低密度脂蛋白（VLDL）升高 E.高密度脂蛋白（HDL）升高 您所选的答案： 本题正确答案：E 题解：高密度脂蛋白（HDL）升高是冠状动脉粥样硬化的保护因素。 202 .

风湿性心脏病二尖瓣狭窄随右心衰竭加重，下列哪项表现会减轻 A.肝脏肿大 B.心率增快 C.心尖区舒张期隆隆样杂音 D.急性肺水肿发作 E.胃肠道淤血症状 您所选的答案： 本题正确答案：D 题解：右心衰竭时，右心排出量明显减少，肺循环血量减少，左心房压相对下降，发生急性肺水肿的危险减少。 203 . 肺炎球菌肺炎抗生素治疗停药指征是 A.热退停药 B.热退3天 C.热退7天 D.临床症状、体征消失 E.胸片炎变消退 您所选的答案： 本题正确答案：B 题解：肺炎球菌肺炎抗菌药物疗程一般为5~7天，或在退热后继续用药3天。 204 .

某地因工业事故，使多人CO中毒，其中昏迷者被送到医院。此时最有效的抢救措施是 A.鼻导管吸氧 B.20%甘露醇快速静脉滴入 C.亚冬眠治疗 D.高压氧治疗 E.血液透析 您所选的答案： 本题正确答案：D 题解：吸入氧可加速COHb解离和CO排出，吸入含5%CO₂的氧更能有效地刺激呼吸，加速CO排出，轻度中毒持续吸氧，流量可达10L/min，中、重度中毒首选高压氧仓治疗，能迅速纠正组织缺氧和排出CO；呼吸停止患者应用人工呼吸器维持呼吸。群体CO中毒且病情

严重，此时最方便有效的抢救措施是高压氧治疗。 205 .

男性，18岁。慢性肾炎5年，肌酐清除率65ml/min，3天前患肺炎。应选用哪种抗生素 A.卡那霉素 B.羧苄青霉素 C.四环素 D.庆大霉素 E.链霉素 您所选的答案： 本题正确答案：B 题解：慢性肾炎患者有感染要及时给予有效抗生素如青霉素G、氨苄西林、红霉素等治疗，尽快控制。避免应用对肾有损害的抗生素(如氨基糖苷类抗生素、磺胺类药等)以及其他药物。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com