

执业医师《内科学》辅导：COPD合并呼衰的治疗 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15793.htm 问题：男性，48岁，肺心病合并呼吸衰竭，心率120次/分，偶发房早，血气：PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 75mmHg，Ph7.20，下列哪项处理重要 A.心得安 B.异搏定 C.奎尼丁 D.毒毛K E.以上都不是 答案及解析：本题选E。严重的CO₂潴留和缺氧可引心悸、球结膜充血水肿、心律紊乱、肺动脉高压、右心衰竭、低血压。这些症状将随着缺氧的纠正和通气功能的改善而得到缓解。在治疗COPD急性加重期的患者时，首先是确定病情急性加重的原因，根据患者的病情严重程度决定门诊或住院。在题中患者PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 75mmHg，应予控制氧疗。理论上只要PaO₂低于正常就可以给予氧疗，实际中严格一些，慢性呼吸衰竭患者PaO₂ 60mmHg. 当PH 此外还需有效的抗生素治疗；支气管扩张药；糖皮质激素；机械通气；呼吸中枢兴奋剂；纠正水电解质紊乱等等。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com