

执业医师《内科学》辅导：心肌疾病病毒感染的阳性指标

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15805.htm

问题：男性，18岁。3周前感冒后心悸气短，胸闷，纳减。查体：心音低钝心律不齐。心电：频发房早室早。血清病毒中和抗体阳性。以下哪项正确：A.1周间两次血清滴定度1倍增高 B.2周间两次血清滴定度2倍增高 C.3周间两次血清滴定度3倍增高 D.3周间两次血清滴定度4倍增高 E.4周间两次血清滴定度4倍增高 答案及解析

：本题选D。心肌疾病病毒感染的阳性指标是发病后3周间两次血清的抗体滴定度有4倍增高。相关内容 1、第2份血清中同型病毒抗体滴度较第1份血清升高4倍（2份血清应相隔2周以上）或一次抗体效价 640者为阳性，320者为可疑（如以132为基础者则宜以 256为阳性，128为可疑阳性，根据不同实验室标准作决定）。2、病毒特异性IgM 1 320者为阳性（按各实验室诊断标准，但需在严格质控条件下）。上述

如同时有同种病毒基因阳性者更支持有近期病毒感染。

3、单有血中肠道病毒核酸阳性，可能为其它肠道病毒感染。

4、从心内膜、心肌、心包或心包穿刺液中测出肠道病毒或其他病毒基因片段。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com