

2004年临床执业医师资格考试试题及参考答案(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_15890.htm

348.男性，20岁，原发性肾病综合征患者，首次治疗，每日用泼尼松60mg，3周后尿蛋白仍为()，此时应(答案：D) A.改为地塞米松 B.将泼尼松加量

到80mg/日 C.改用环磷酰胺 D.用原量继续观察 E.减少泼尼松量到40mg/日，加用免疫抑制剂

349.男性，38岁，1月来乏力、食欲差，左上腹胀痛。查体：肝肋下3cm，脾肋下10cm，血红蛋白70g/L，白细胞 $260 \times 10^9/L$ ，血小板 $210 \times 10^9/L$ ，白细胞分类：中性粒及晚幼粒细胞为主，中性粒细胞碱性磷酸酶活性减低，首选治疗(答案：A) A.羟基脲 B.三代头孢 C.脾切除 D.DA方案 E.保肝治疗

350.男性，16岁，3天来左膝关节肿胀。自幼于外伤后易出血不止。查体：皮肤粘膜未见出血及紫癜，出血时间2分；凝血时间30分，凝血酶原时间正常，疾病分类应为(答案：B) A.纤维蛋白生成障碍 B.凝血酶生成障碍 C.血小板异常 D.凝血活酶生成障碍 E.血管壁功能异常

351.男性，28岁，心慌、怕热、多汗、消瘦、易饿4个月，甲状腺弥漫性度肿大，血TSH降低，T3和T4增高，诊为甲亢。

他巴唑每天30mg，20天后血白细胞 $2.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $1.0 \times 10^9/L$ 。甲亢的下一步治疗易选(答案：B) A.他巴唑剂量减半再用 B.他巴唑与升白细胞药合用 C.改用丙基硫氧嘧啶 D.核素 ^{131}I 治疗 E.白血球恢复正常后立即手术治疗

352.女性，44岁，健康体检发现甲状腺肿大就诊，查体甲状腺对称性度肿大，表面不平，中等硬度，无触痛，无血管杂音，心率78次/分，拟诊慢性淋巴性甲状腺炎，有助于确诊的首选检

查是（答案：B） A.TSH、FT3、FT4 B.抗甲状腺抗体 C.甲状腺B超声 D.甲状腺吸¹³¹I率 E.甲状腺CT

353.男，45岁，身高171cm，体重85kg，口服葡萄糖耐量试验血糖结果：空腹6.7mmol/L，1小时9.8 mmol/L，2小时7.0 mmol/L.结果符合（答案：B） A.正常曲线 B.空腹血糖受损 C.糖耐量低 D.1型糖尿病 E.2型糖尿病

354.女性，48岁，发热伴对称性多关节肿痛，晨僵3个月，查ANA低滴度阳性，RF（ ）和IgG补体升高，最可能的诊断是（答案：C） A.多肌炎 B.系统性红斑狼疮 C.类风湿关节炎 D.干燥综合征 E.混合性结缔组织病

355.男性，26岁，与其父吵架后服敌敌畏60，30分钟后被家人送到医院，神志清楚，治疗过程中最重要的措施是（答案：E） A.静脉注射安定 B.应用阿托品 C.应用解磷啶 D.应用水合氯醛 E.彻底洗胃

356.男性，44岁，发现HBsAg阳性9年，时有增高，近3周来食欲下降，尿黄，明显乏力，齿龈出血，近2周尿少。查体：神清，扑翼样震颤（ ），化验：ALT176U/L，TBIL432umol/L，PT38秒（对照13秒），该患者应诊断为（答案：C） A.病毒性肝炎 乙型 慢性重型 B.病毒性肝炎 乙型 亚急性重型 C.病毒性肝炎 乙型 慢性重度 D.乙肝后肝硬化 E.病毒性肝炎 乙型 慢性中度

357.一职工从沿海某城市归来，腹泻1天，10余次，水样便，到市医院求治，疑为肠炎，后大便培养出E1 - Tor型细菌。诊断后11小时医师上报疫情，国家要求上报此类传染病最迟不超过（答案：B） A.6小时 B.12小时 C.18小时 D.24小时 E.48小时

358.一伤寒患者经治疗后体温渐降，但未降至正常，此后体温再次升高，血培养阳性，属于（答案：B） A.复发 B.再燃 C.重复感染 D.混合感染 E.再感染

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com