

巧记有并发症的高血压病和抗心律失常选药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_B7_A7_E8_AE_B0_E6_9C_89_E5_c22_15930.htm

一、有并发症的高血压

病药物治疗 1 合并心力衰竭，选ACEI、利尿剂，不选 受体阻滞剂。

2 合并肾功能不全者可选钙拮抗剂、ACEI、甲基多巴，不宜选噻嗪类。

3 合并冠心病、心绞痛者应选 受体阻滞剂或钙拮抗剂。

4 合并脑卒中，不宜选中枢性降压药。

5 老年人收缩期高血压，选利尿剂、长效二氢吡啶类钙拮抗剂。

6 有高血脂、糖尿病、痛风者不宜用利尿剂或 受体阻滞剂，

以免血糖、血脂和尿酸升高。可选用 1受体阻滞剂。

7 伴妊娠者，不宜用ACEI和AT1拮抗剂，可选用甲基多巴。

8 合并抑郁症、支气管哮喘，不宜选用 受体阻滞剂。

9 心脏传导阻滞者，不宜用 受体阻滞剂及非二氢吡啶类钙拮抗剂。

10 心率较快者可用 受体阻滞剂。

11 前列腺肥大者可加用 受体阻滞剂。

二、抗心律失常药物治疗 1 先单独用药，

然后联合用药；以最小的剂量取得满意的治疗效果；先考虑

降低危险性，再考虑缓解症状；充分注意药物的不良反应及

致心律失常的作用。5 广谱：奎尼丁、胺碘酮、普罗帕酮

6 室上性心律失常：普萘洛尔（窦性心动过速）、维拉帕米（

室上性心动过速）7 普萘洛尔、维拉帕米兼有降压和抗心绞痛

作用 8 心房颤动、心房扑动转律：强心苷、奎尼丁

9 室性心律失常：利多卡因（首选/心梗）、苯妥英钠（强心苷中毒）

10 在治疗剂量下能引起严重低血压的药物：静脉注射普鲁卡因胺、利多卡因、普萘洛尔、维拉帕米，口服奎尼丁

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com