

执业医师《外科学》辅导：急性尿潴留 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16115.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16115.htm) 问题：男性，68岁，因饮酒后不能自行排尿6小时，于急诊住院，体检时血压正常，可见耻骨上包块，有轻压痛，无头昏、心慌。1.该患者最可能的病因是 A.尿道结石 B.膀胱炎 C.膀胱肿瘤 D.前列腺增生 E.神经性膀胱 2.要确诊病因，最简便的影像学检查是 A.排泄性尿路造影 B.MRI C.腹平片（KUB） D.B超 E.膀胱造影检查 请问答案选什么，为什么？ 答案及解析：1、D 2、D 患者68岁，饮酒后出现急性尿潴留。老年患者常见前列腺增生。有资料表明，在50岁男性，病理检查有50%可见前列腺增生性改变，80岁时，这种改变可高达90%。目前公认老龄和有功能的睾丸是发病的基础，两者缺一不可。由于气候变化、饮酒、劳累等方面的原因，前列腺突然充血水肿，可发生急性尿潴留。B超可以直接测定前列腺的大小、内部结构、突入膀胱的程度，经直肠超声扫描更为精确，超声波检查还可以测定膀胱残余尿量。 相关名词 良性前列腺增生：benign prostatic hyperplasia 急性尿潴留：acute retention of urine 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)