

执业医师《内科学》辅导：类白血病反应和慢性粒细胞白血病的鉴别 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16138.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16138.htm)

问题：慢粒与类白血病最主要的鉴别点？解析：类白血病反应是由于各种原因引起的白细胞极度增多，伴外周血中出现幼稚细胞，因血象极易和白血病混淆，称为类白血病反应，但病因去除类白血病血象可以很快消失。中性粒细胞类白血病反应常有下列特点，借此与慢粒鉴别：1、常并发于严重感染、恶性肿瘤等疾病，因此有原发疾病的临床表现。2.白细胞数很少超过 $50 \times 10^9/L$ ，嗜酸、嗜碱粒细胞一般不增多，中性粒细胞胞浆内常有中毒性颗粒和空泡。3.脾大常不如慢粒显著。4.中性粒细胞碱性磷酸酶（NAP）染色呈强阳性。5.Ph染色体阴性。6.原发病控制后，类白血病反应消失。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)