

执业医师《内科学》辅导：鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16145.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16145.htm)

问题：下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是 A. TSH B. TT3 C. TT4 D. FT3 E. FT4 答案是A，为什么？答案及解析：本题选A。血清促甲状腺激素（TSH）测定，显著增高者为原发性甲减TSH血清促甲状腺激素（TSH）测定测定TSH对甲减有极重要意义，较T4、T3为大，其正常值为 $0 \sim 4 \mu\text{u} / \text{ml}$ ，以 $10 \mu\text{u} / \text{ml}$ 为高限（本院为 $2 \pm 1\text{ng} / \text{ml}$ ）。如本病因甲状腺本身破坏引起者TSH显著升高，常 $> 20 \mu\text{u} / \text{ml}$ ，如 $< 10 \mu\text{u} / \text{ml}$ 且甲状腺激素血浓度降低，则表示垂体TSH储备功能降低，属继发于下丘脑或垂体性甲减，但根据下丘脑-垂体病情轻重，TSH可正常，偏低或明显降低。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)