

临床执业医师资格考试题-妇儿科-2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16155.htm 61. 缺铁性贫血易发年龄A. 6月3岁的婴幼儿B. 3月6月C. 2岁—3岁D. 学龄前E. 学龄儿62. 叶酸缺乏性巨幼红细胞贫血的发病高发年龄为A. 出生后1岁B. 生后47个月C. 生后8个月D. 生后23个月E. 1岁以后63. 维生素B12缺乏性贫血的发病高发年龄是A. 生后47个月B. 生后半年C. 1岁以后D. 生后23个月E. 生后3—4个月64. 新生儿肾表面凹凸不平，其下极可低至髂嵴以下的A. 第1腰椎水平 B. 第2腰椎水平C. 第3腰椎水平D. 第4腰椎水平E. 第1骶椎水平65. 肾脏开始泌尿的时间为A. 胚胎6—9周B. 胚胎9—12周C. 胚胎24周D. 胚胎36周E. 出生后66. 肾功能接近成人水平的年龄是A. 2岁后B. 3岁后C. 14岁D. 1岁以后E. 6个月67. 肾小球滤过率接近成人的年龄为A. 出生后约12周B. 出生后36个月C. 12岁D. 3岁以后E. 出生后6—12个月68. 下列各种论述中，不正确的是A. 92%的新生儿于生后24小时内排尿B. 99%的新生儿于生后48小时内排尿C. 超过48小时未排尿者多为病理性D. 初生头几天每日排尿约5—10次E. 新生儿尿液呈低张尿69. 关于每日平均尿量的说法中，下列错误的是A. 新生儿初生数日每日平均尿量约为30~100mlB. 2周后每日尿量约为200~400mlC. 婴儿约为400~500mlD. 学龄前儿童600~1000mlE. 学龄儿童约800~1400ml70. 下列论述中不正确的是A. 正常情况下新鲜尿离心沉渣中，每高倍视野可见到红细胞0—1个B. 尿红细胞 > 5个 / 高倍视野视为显微镜下血尿C. 12小时尿沉渣计数红

细胞数应小于400万个D．新鲜离心尿中白细胞数 > 10个 / 高倍视野视为异常E．正常小儿尿中有少量尿蛋白，通常小于500mg/L71．急性肾小球肾炎的治疗措施中，下列不正确的是A．急性肾小球肾炎的治疗需在早期对慢性感染灶予以清除B．不需要长期用抗生素预防链球菌感染C．少尿及有明显循环充血者常用速尿和利尿酸注射D．一般病例可口服双氢克尿噻进行利尿治疗E．一般忌用保钾利尿剂及渗透性利尿剂71．下列关于肾小球肾炎治疗的论述中，不正确的是A．发生轻度高血压只需卧床休息B．收缩压超过18.7KPa，舒张压高于12KPa时应予降压药C．常用利血平口服或肌肉注射治疗高血压D．出现严重循环充血及肺水肿时多采用洋地黄强心治疗E．利血平常用量为0.07mg/kg次73．下列关于肾病综合症的论述中，不正确的是A．继发性肾病综合症是指在诊断明确的原发疾病基础上出现的肾病综合症B．肾病综合症是以大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症及明显浮肿为共同特征的临床综合症C．原发性肾病综合症有小儿多见，发病率占住院小儿泌尿系疾病第一位D．原发性肾病综合症病因不明E．肾病综合症可分为原发性肾病综合症和继发性肾病综合症74. 关于结核病的叙述，下列哪一项是不正确的A．结核病的肺结核为多见B．结核病的传染途径主要是消化道传染C．小儿多表现为低热和结核中毒症状，而呼吸系统多不明显D．结核杆菌在紫外线照射下1020分钟即可死亡E．70%酒精接触2分钟可杀死结核杆菌75．关于结核病的诊断的论述中，下列不正确的是A．结核菌素试验阴性表示未受感染B．结核菌素试验阳性表示接种卡介苗后或结核感染C．结核病痊愈后多保持终生阳性反应D．结核菌素试验阴性是指红晕及

硬肿直径 < 5mmE . 结核菌素试验()是指红晕及硬肿直径

1019mm76 . 下列哪一项不是结核病的治疗原则A . 早期应用B . 联合应用C . 足量D . 分阶段用药E . 规律用药77 . 下列

哪一项不是决定肾病综合症预后的因素A . 肾脏的病理类型B

. 有无严重的并发症C . 是否为肾炎性肾病D . 是否发展为终

末期肾功能衰竭E . 是否发生严重感染转贴于：100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com