

临床执业医师资格考试题-妇儿科-3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16158.htm 81. 预防风湿热初发和复发的关键是A. 早期诊断和治疗链球菌咽峡炎B. 改善生活环境C. 增强免疫力D. 预防咽峡炎E. 使用链球菌细胞壁M蛋白质疫苗82. 关于法乐四联症的叙述中，下列哪项是不正确的A. 临床症状的严重程度与肺动脉狭窄的严重程度成正比B. 典型的法乐四联症于生后半年至一年动脉导管关闭后紫绀减轻C. 紫绀经常会出现于毛细血管丰富的部位D. 2岁以下小儿多有缺氧发作E. 是最常见的紫绀型先天性心脏病83. 对法乐四联症的治疗措施中，哪一项是不正确的A. 较轻的缺氧发作治疗使之取胸膝位即可缓解B. 若经常有缺氧发作，可口服心得安预防C. 手术最佳年龄一般在23岁以上D. 肺血管发育较差者适于根治手术E. 缺氧发作严重者可予以静脉注射心得安84. 关于动脉导管未闭的治疗的叙述，不正确的是A. 一旦确诊均宜手术结扎或切断治疗B. 大型动脉导管伴心功能不全者主张急症手术C. 对早产儿患者可口服消炎痛D. 儿童可用心导管法治疗E. 新生儿期大型导管伴心功能不全者，主张药物控制心衰后急症手术85. 关于室间隔缺损的临床表现中，论述不正确的是A. 胸骨左缘第3、4肋间闻及响亮粗糙级收缩期杂音B. 肺动脉第2音亢进C. 心尖区可闻及舒张期杂音D. 小型缺损在婴儿期出现症状E. 震颤也可不明显86. 关于室间隔缺损的X线检查结果中，不正确的是A. 小型缺损心影正常B. 大型缺损，心影中度或重度增大C. 肺血管阴影可有突然中断现象D. 肺纹增粗增多E. 肺野清晰87. 下列哪项

不是室间隔缺损的并发症A．肺水肿B．感染性心内膜炎C．主动脉瓣狭窄D．漏斗部肥厚E．充血性心力衰竭88．关于病理性黄疸，不正确的是A．黄疸常在24小时之内出现B．黄疸程度严重，血清胆红素大于 $205\mu\text{mol/L}$ 或每日上超过 $85\mu\text{mol/L}$ C．病理性黄疸可因饥饿所致D．黄疸消退后重现或进行性加重E．黄疸持久不退，持续3周以上89．对于新生儿败血症的治疗，哪项措施是不正确的A．在获得血培养报告之前，同时选用二种抗生素B．早产儿及生后一周内可用庆大霉素治疗，连续用药不应超过二周C．疑为厌氧菌感染可用灭滴灵D．估计为金黄色葡萄球菌感染宜选新青霉素 E．头孢菌素类适用于新生儿败血症的治疗90．关于小儿发育的说法中，不正确的是A．6岁以下小儿肝脏可在肋缘下 23cm 处扪及B．3个月以内脾脏在肋缘下刚摸及未正常C．小儿膀胱充盈时可在耻骨上摸到D．2岁以上小儿Babinski征一侧阳性一侧阴性有病理意义E．新生儿唾液分泌量4个月时达成人水平[BI型题]以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

A．出生后6个月B．出生后第三周C．出生后第一天D．出生后24周E．出生后2周以后91．对人脸图案感兴趣出现时间92．能注视母亲面孔时间93．生理性斜视消失时间94．瞳孔反射出现时间95．有明显的听觉定向能力时间A．失水量为体重的5%左右B．失水量为体重的510%左右C． $1/2\sim 2/3$ 张含钠液D． $1/3\sim 1/8$ 张含钠液E． $1/5$ 张含钠液96．补充生理需要量的补液成分为97．低渗性脱水时，补充累积损失量所

需的液体成分为98．高渗性脱水时，补充累积损失量所需的液体成分为99．轻度脱水失水量100．中度脱水失水量A．蛋花汤样便，无腥臭味B．粘液脓样便C．暗绿海水色便D．黄色稀便，可见豆腐渣样细块E．蛋花汤样便，有腥臭味

转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com