

2006年口腔助理医师复习试题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_16192.htm

1.一患者戴用全口义齿一周，主诉咀嚼费力，粘膜压痛，面部酸胀。处理方法是（D）。 A.坚持戴用，逐渐适应 B.调合 C.基托组织面缓冲 D.重新制作 E.重衬

2.腭小凹位于（E）。 A.切牙乳突前方 B.腭皱与切牙乳突之间 C.腭皱后方 D.上颌牙槽嵴后缘 E.软硬腭交界处，腭中缝两侧

3.患者戴用全口义齿一月，复查时自述戴牙后一直感觉咀嚼无力，面部酸痛。如果检查发现息止颌间隙过大，最好的处理方法是（B）。 A.重衬 B.自凝塑料加高咬合 C.嘱患者慢慢适应 D.修改面形态 E.重新制作

4.全口义齿修复应在拔牙多长时间后进行（D）。 A.一周 B.三周 C.一个月 D.三个月 E.六个月

5.全口义齿后牙选用无尖牙的优点不包括（E）。 A.侧向力小 B.有利于义齿的稳定 C.容易达到平衡合 D.对牙槽嵴损害小 E.咀嚼效率低

6.全口义齿摘戴时疼痛，定位明确，戴入后无明显不适。其原因是（B）。 A.基托边缘过长 B.基托进入组织倒凹 C.基托组织面有小结节 D.骨隆突处未缓冲 E.基托不密合

7.上颌第一磨牙舌尖与平面的距离是（B）。 A.近中舌尖0mm，远中舌尖0.5mm B.近中舌尖0mm，远中舌尖1mm C.近中舌尖0mm，远中舌尖1.5mm D.近中舌尖1mm，远中舌尖0.5mm E.近中舌尖1mm，远中舌尖2mm

8.试戴时，可采用如下方法判断颌位关系是否正确，除了（C）。 A.用后牙咬合时，双侧颞部肌肉收缩明显 B.咬合时，义齿基托是否有移动，扭动 C.张口时，上颌义齿是否有脱落 D.卷舌后，下颌是否还能后退 E.后牙咬合时，是否偏向一侧

9.属于缓冲区（C）

。 A.上颌牙槽嵴顶 B.磨牙后垫 C.切牙乳突 D.颊侧前庭 E.颊系带

10.全口义齿与唇颊肌作用关系最密切的表面是 (B)。 A.牙平面 B.磨光面 C.咬合面 D.组织面 E.吸附面

11.义齿初戴时，给患者的医嘱中错误的是 (D)。 A.会有异物感、发音不清等，要坚持戴用 B.先进食小块软食 C.避免咬硬物 D.可能有疼痛，要坚持戴用 E.尽量用两侧后牙同时咀嚼

12.一患者戴用全口义齿一周，主诉左侧后牙经常咬腮，无其他不适。最可能的原因是 (B)。 A.左侧后牙覆盖过大 B.左侧后牙覆盖过小 C.左侧后牙工作侧干扰 D.左侧后牙平衡侧干扰 E.右侧后牙平衡侧干扰

13.在石膏模型上制作后堤区时，最宽处的宽度为 (C)。 A.1mm B.3mm C.5mm D.8mm E.10mm

14.后牙区堤平面应平行于 (D)。 A.上唇 B.瞳孔连线 C.鼻底 D.鼻翼耳屏线 E.眶耳平面

15.根据无牙颌各部分组织结构特点及与全口义齿的关系，无牙颌被分为以下四区，除了 (D)。 A.主承托区 B.副承托区 C.边缘封闭区 D.后堤区 E.缓冲区

转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com