

临床执业医师资格考试题-妇儿科-(五) PDF转换可能丢失
图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16208.htm 81. 预防风湿热初发和复发的关键是 A. 早期诊断和治疗链球菌咽峡炎 B. 改善生活环境 C. 增强免疫力 D. 预防咽峡炎 E. 使用链球菌细胞壁M蛋白质疫苗

82. 关于法乐四联症的叙述中, 下列哪项是不正确的 A. 临床症状的严重程度与肺动脉狭窄的严重程度成正比 B. 典型的法乐四联症于生后半年至一年动脉导管关闭后紫绀减轻 C. 紫绀经常会出现于毛细血管丰富的部位 D. 2岁以下小儿多有缺氧发作 E. 是最常见的紫绀型先天性心脏病

83. 对法乐四联症的治疗措施中, 哪一项是不正确的 A. 较轻的缺氧发作治疗使之取胸膝位即可缓解 B. 若经常有缺氧发作, 可口服心得安预防 C. 手术最佳年龄一般在23岁以上 D. 肺血管发育较差者适于根治手术 E. 缺氧发作严重者可予以静脉注射心得安

84. 关于动脉导管未闭的治疗的叙述, 不正确的是 A. 一旦确诊均宜手术结扎或切断治疗 B. 大型动脉导管伴心功能不全者主张急症手术 C. 对早产儿患者可口服消炎痛 D. 儿童可用心导管法治疗 E. 新生儿期大型导管伴心功能不全者, 主张药物控制心衰后急症手术

85. 关于室间隔缺损的临床表现中, 论述不正确的是 A. 胸骨左缘第3-4肋间闻及响亮粗糙 2-3级收缩期杂音 B. 肺动脉第2音亢进 C. 心尖区可闻及舒张期杂音 D. 小型缺损在婴儿期出现症状 E. 震颤也可不明显

86. 关于室间隔缺损的X线检查结果中, 不正确的是 A. 小型缺损心影正常 B. 大型缺损, 心影中度或重度增大 C. 肺血管阴影可有突然中断现象 D. 肺纹增粗增

多 E . 肺野清晰87 . 下列哪项不是室间隔缺损的并发症 A . 肺水肿 B . 感染性心内膜炎 C . 主动脉瓣狭窄 D . 漏斗部肥厚 E . 充血性心力衰竭88 . 关于病理性黄疸 , 不正确的是 A . 黄疸常在24小时之内出现 B . 黄疸程度严重 , 血清胆红素大于 $205\mu\text{mol/L}$ 或每日上超过 $85\mu\text{mol/L}$ C . 病理性黄疸可因饥饿所致 D . 黄疸消退后重现或进行性加重 E . 黄疸持久不退 , 持续3周以上89 . 对于新生儿败血症的治疗 , 哪项措施是不正确的 A . 在获得血培养报告之前 , 同时选用二种抗生素 B . 早产儿及生后一周内可用庆大霉素治疗 , 连续用药不应超过二周 C . 疑为厌氧菌感染可用灭滴灵 D . 估计为金黄色葡萄球菌感染宜选新青霉素 E . 头孢菌素类适用于新生儿败血症的治疗90 . 关于小儿发育的说法中 , 不正确的是 A . 6岁以下小儿肝脏可在肋缘下 23cm 处扪及 B . 3个月以内脾脏在肋缘下刚摸及未正常 C . 小儿膀胱充盈时可在耻骨上摸到 D . 2岁以上小儿Babinski征一侧阳性一侧阴性有病理意义 E . 新生儿唾液分泌量4个月时达成人水平

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com