

临床执业医师资格考试题-妇儿科-(四) PDF转换可能丢失
图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16209.htm 61. 缺铁性贫血易发年龄 A. 6月3岁的婴幼儿 B. 3月6月 C. 2岁—3岁 D. 学龄前 E. 学龄儿
62. 叶酸缺乏性巨幼红细胞贫血的发病高发年龄为 A. 出生后1岁 B. 生后47个月 C. 生后8个月 D. 生后23个月 E. 1岁以后
63. 维生素B₁₂缺乏性贫血的发病高发年龄是 A. 生后47个月 B. 生后半年 C. 1岁以后 D. 生后23个月 E. 生后3—4个月
64. 新生儿肾表面凹凸不平, 其下极可低至髂嵴以下的 A. 第1腰椎水平 B. 第2腰椎水平 C. 第3腰椎水平 D. 第4腰椎水平 E. 第1骶椎水平
65. 肾脏开始泌尿的时间为 A. 胚胎6—9周 B. 胚胎9—12周 C. 胚胎24周 D. 胚胎36周 E. 出生后
66. 肾功能接近成人水平的年龄是 A. 2岁后 B. 3岁后 C. 14岁 D. 1岁以后 E. 6个月
67. 肾小球滤过率接近成人的年龄为 A. 出生后约12周 B. 出生后36个月 C. 12岁 D. 3岁以后 E. 出生后6—12个月
68. 下列各种论述中, 不正确的是 A. 92%的新生儿于生后24小时内排尿 B. 99%的新生儿于生后48小时内排尿 C. 超过48小时未排尿者多为病理性 D. 初生头几天每日排尿约5—10次 E. 新生儿尿液呈低张尿
69. 关于每日平均尿量的说法中, 下列错误的是 A. 新生儿初生数日每日平均尿量约为30~100ml B. 2周后每日尿量约为200~400ml C. 婴儿约为400~500ml D. 学龄前儿童600~1000ml E. 学龄儿童约800~1400ml
70. 下列论述中不正确的是 A. 正常情况下新鲜尿离心沉渣中, 每高倍视野可见到红细胞0—1个 B. 尿红细胞 > 5个 / 高倍视野视为显微镜下血尿 C. 12小时尿沉渣

计数红细胞数应小于400万个 D . 新鲜离心尿中白细胞数 > 10个 / 高倍视野视为异常 E . 正常小儿尿中有少量尿蛋白 , 通常小于500mg/L⁷¹ . 急性肾小球肾炎的治疗措施中 , 下列不正确的是 A . 急性肾小球肾炎的治疗需在早期对慢性感染灶予以清除 B . 不需要长期用抗生素预防链球菌感染 C . 少尿及有明显循环充血者常用速尿和利尿酸注射 D . 一般病例可口服双氢克尿噻进行利尿治疗 E . 一般忌用保钾利尿剂及渗透性利尿剂⁷¹ . 下列关于肾小球肾炎治疗的论述中 , 不正确的是 A . 发生轻度高血压只需卧床休息 B . 收缩压超过18 . 7KPa , 舒张压高于12KPa时应予降压药 C . 常用利血平口服或肌肉注射治疗高血压 D . 出现严重循环充血及肺水肿时多采用洋地黄强心治疗 E . 利血平常用量为0 . 07mg/kg次⁷³ . 下列关于肾病综合症的论述中 , 不正确的是 A . 继发性肾病综合症是指在诊断明确的原发疾病基础上出现的肾病综合症 B . 肾病综合症是以大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症及明显浮肿为共同特征的临床综合症 C . 原发性肾病综合症有小儿多见 , 发病率占住院小儿泌尿系疾病第一位 D . 原发性肾病综合症病因不明 E . 肾病综合症可分为原发性肾病综合症和继发性肾病综合症

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com