

内科学造血系统疾病习题及参考答案5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E5\\_86\\_85\\_E7\\_A7\\_91\\_E5\\_AD\\_A6\\_E9\\_c22\\_16225.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E5_86_85_E7_A7_91_E5_AD_A6_E9_c22_16225.htm)

141.女，15岁，面色苍白，疲乏无力三个月；体格检查：球结膜无黄染，脾轻度增大；血象RBC  $3.5 \times 10^{12} / L$ ，Hb  $66g / L$

，WBC  $5.6 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.70，淋巴细胞0.30，血小板 $170 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞0.02，该患者最可能的诊断是 A.慢性肝炎 B.溶血性贫血 C.缺铁性贫血 D.巨幼细胞性贫血 E.再生障碍性贫血 答案：C

142.女，23岁，近三年来月经血多，下肢淤血癍，时有齿龈出血。血象RBC

$3.0 \times 10^{12} / L$ ，Hb  $60g / L$ ，血小板 $30 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞0.03，血涂片显示红细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大，此病人最可能的诊断是

A.慢性粒细胞性白血病急变期 B.急性白血病 C.特发性血小板减少性紫癜 D.缺铁性贫血 E.ITP合并缺铁性贫血 答案：E

143.男，40岁，嗜酒，Hb  $56g / L$ ，MCV  $65f1$ ，血清铁蛋白 $8 \mu g / L$ ，口服铁剂治疗两个月无效，下一步采取哪种措施最重要

A.加大铁剂用量 B.胃肠道检查进一步查找病因 C.戒酒 D.加服止血药 E.改用注射铁剂 答案：B

144.男，46岁，胃溃疡病史20年，近3个月疼痛加重，伴头晕、乏力，面色苍白。

查Hb  $70g / L$ ，红细胞形态具备小细胞低色素特点，SF  $8 \mu g / L$ ，SI  $30 \mu g\%$ ，TIBC  $600 \mu g\%$ ，在下一步诊断措施中，哪一项最重要

A.骨髓造血细胞形态学检查 B.大便潜血试验 C.铁剂试验治疗 D.胃液分析及脱落细胞学检查 E.胃镜下可疑病变部位病理活组织检查 答案：E

145.一贫血患者，测

得MCV 75fl, MCH 24pg, MCHC 31%, 网织红细胞0.011, 口服硫酸亚铁0.3 / 次, 每日3次治疗一周, 复查RBC、Hb未见明显改善, 网织红细胞0.065, 对此患者应采取 A.继续口服铁剂治疗 B.改用注射铁剂 C.加用叶酸、维生素B12治疗 D.换用叶酸、维生素B12治疗 E.加强输血治疗 答案: A

146.慢性骨髓炎患者, Hb 80g / L, SI 40  $\mu$ g%, TIBC 220  $\mu$ g%, 骨髓幼红细胞外铁, 铁粒幼红细胞0.15, 其贫血为 A.缺铁性贫血 B.铁粒幼细胞性贫血 C.巨幼细胞性贫血 D.慢性感染性贫血 E.再生障碍性贫血 答案: D

147.男, 17岁, 头晕、乏力三个月; 面色蜡黄, 巩膜轻度黄染; 血象RBC  $1.5 \times 10^{12}$  / L, Hb 66g / L, WBC  $3.6 \times 10^9$  / L, 分类可见少量幼粒、幼红细胞, 血小板 $70 \times 10^9$  / L, 网织红细胞0.02, 肝功: 间接胆红素38mmol / L.该患者最可能的诊断为 A.再生障碍性贫血 B.缺铁性贫血 C.巨幼细胞性贫血 D.急性白血病 E.黄疸性肝炎 答案: C

转贴于: 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)