

执业医师资格考试：药理学模拟试题及答案(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16257.htm [A1型题] 以下每一考

题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。 1

. 半数致死量(LD₅₀)是指 A . 能使群体中有半数个体出现某一效应的剂量 B . 能使群体中有50个个体出现某一效应的剂量 C . 能使群体中有一半个体死亡的剂量 D . 能使群体中有一半以上个体死亡的剂量 E . 以上说法均不对 2 . 副作用是指

A . 与治疗目的无关的作用 B . 用药量过大或用药时间过久引起的 C . 用药后给病人带来的不舒适的反应 D . 在治疗剂量出现与治疗目的无关的作用 E . 停药后，残存药物引起的反应 3 . 下列受体与其激动剂搭配正确的是 A . 受体—肾上腺素 B . 受体—可乐定 C . M受体—烟碱 D . N受体—毛果芸香碱 E . 1受体—异丙肾上腺素 4 . 有关阿托品的各项叙述

，错误的是 A . 阿托品可用于各种内脏绞痛 B . 可用于治疗前列腺肥大 C . 对中毒性痢疾有较好的疗效 D . 可用于全麻前给药以制止腺体分泌 E . 能解救有机磷酸酯类中毒 5 . 受体阻断剂一般不用于 A . 心律失常 B . 心绞痛 C . 青光眼 D . 高血压 E . 支气管哮喘 6 . 下列用于镇静催眠最好的药是 A . 地西洋 B . 氯氮草 C . 巴比妥类 D . 苯妥英钠 E . 奥沙西洋 7 . 左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于 A . 脑膜炎后遗症 B . 乙型肝炎 C . 肝性脑病 D . 心血管疾病 E . 失眠 8 . 临床上不把保泰松作为抗风湿首选药，是因为 A . 保泰松抗风湿作用较弱 B . 保泰松造价昂贵 C . 保泰松的蛋白结合率

太低 D . 保泰松的不良反应多且严重 E . 以上说法均不对 9 . 下列哪个是阿片受体的特异性拮抗药 A . 美沙酮 B . 纳洛酮 C . 芬太尼 D . 曲马朵 E . 烯内吗啡 10 . 对强心甙中毒引起的重症快速型心律失常 , 可用哪种药治疗 A . 阿托品 B . 利多卡因 C . 戊巴比妥 D . 地西洋 E . 苯妥英钠 11 . 钙离子通道有四种亚型 , 哪种不对 A . L型 B . S型 C . N型 D . T型 E . P型 12 . 有关可乐定的叙述 , 错误的是 A . 可乐定是中枢性降压药 B . 可东定可用于治疗中度高血压 C . 可乐定可用于治疗重度高血压 D . 可乐定可用于治疗高血压危象 : E . 可乐定别称氯压定 13 . 硝普钠主要用于 A . 用于高血压危象 B . 用于中度高血压伴肾功能不全 ; C . 用于重度高血压 D . 用于轻、中度高血压 E . 用于中、重度高血压 14 . 心律失常发生的机制是 A . 心肌兴奋过度导致异常 B . 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常 C . 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常 D . 潜在起搏点搏动频率加快 E . 以上说法均不对 15 . 下列不能用于治疗心律失常的是 A . 奎尼丁 B . 普萘洛尔 C . 维拉帕米 D . 氢氯噻嗪 E . 胺碘酮 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com