

执业助理模拟考题第二套（第二单元）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_16279.htm 每一道考题下面有A

- 、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。
1. 关于女性外生殖器解剖，哪项正确? A．阴阜为耻骨前面的脂肪垫，长有阴毛，呈尖端向上的三角形 B．大阴唇外侧面与皮肤相同，内侧面似粘膜，富有皮脂腺和汗腺 C．阴蒂相当于男子的球海绵体 D．前庭大腺开口于小阴唇与处女膜间的沟内 E．尿道旁腺位于尿道口两侧，常为细菌潜伏所在
 2. 下列哪些不是卵巢良性肿瘤的并发症? A．生长迅速 B．蒂扭转 C．恶变 D．破裂 E．感染
 3. 卵巢畸胎瘤最常见的并发症为 A．腹水 B．蒂扭转 C．恶变 D．破裂 E．感染
 4. 关于子宫，哪项错误? A．为空腔器官，腔内覆有粘膜 B．非孕时，子宫肌壁厚约0.8cm C．子宫肌壁外层纵向，内层环形，中层各方交织 D．子宫内膜表面1/3受卵巢激素的影响，发生周期性变化 E．子宫浆膜层即为与肌层紧贴的腹膜
 5. 治疗原发性宫缩乏力，以下哪项处理是正确的? A．禁忌应用镇静剂 B．肥皂水洗肠会引起感染 C．给予催产素肌注，加强产力、D．胎头达棘平，羊膜囊凸，人工破膜会加强产力 E．速行剖宫产
 6. 关于滴虫性阴道炎，哪项错误? A．滴虫可侵入尿道、尿道旁腺、膀胱及肾盂 B．分泌物呈灰黄、稀薄，有泡沫，阴道粘膜可见散在红色斑点 C．有外阴瘙痒、性交疼痛、尿频、尿痛等症状，可导致不育 D．阴道分泌物悬滴法找到滴虫即可诊断 E．若悬滴法找不到滴虫，可用酸性液灌洗阴道后复查
 7. 我国现定义的围产期是指 A.围绕分娩前后1周以内的

阶段 B.分娩前1周到分娩后24小时以内 C.妊娠28周以后到分娩后1周以内 D.妊娠20周以后到分娩后4周以内 E.妊娠28周以后到分娩后4周以内

8. 指出下列正常分娩机转哪项是正确的? A . 衔接：无论初产妇、经产妇儿头均于临产后衔接 B . 俯屈：大囟门下降位置最低 C . 内旋转、大囟门转向母体前方 D . 仰伸：颜部紧贴胸部 E . 外旋转：胎头随肩的旋转而外旋转

9. 阴道炎的防治原则不包括 A.首先根据致病菌合理选择抗生素 B.根据不同致病菌选择不同酸碱度的药液冲洗 C.一般以口服药物为主 D.性伴侣常需要同时诊治 E.用药后应复查，常需要巩固治疗

10. 无排卵性功血主要发生在 A . 妊娠期与哺乳期 B . 更年期与绝经期 C . 绝经后 D . 青春期与更年期 E . 育龄期

11. 哪项不是子宫胎盘卒中的处理? A . 按摩子宫 B . 宫壁内注射宫缩剂 C . 经积极处理子宫仍不收缩应立即切子宫 D . 经积极处理出现血液不凝，立即切子宫 E . 不能静脉点滴麦角新碱

12. 女性生殖器三大恶性肿瘤指的是 A . 宫颈癌、子宫内膜癌、外阴癌 B . 宫颈癌、子宫内膜癌、绒癌 C . 宫颈癌、子宫内膜癌、子宫肉瘤 D . 宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌 E . 宫颈癌、卵巢癌、绒癌

13. 预防宫颈癌普查最常用的方法是 A . 宫颈针吸细胞学 B . 宫颈刮片细胞学检查 C . 宫颈活组织检查 D . 宫颈碘实验 E . 测阴道分泌物pH值

14. 母子血型不合，下列哪项是正确的? A.ABO血型不合一定发生在第二胎 B.父Rh阳性，母Rh阴性者每次怀孕都会发生新生儿溶血病 C.测定孕妇血清中抗体及其效价，对胎儿的估计无临床意义 D.胎儿有溶血时羊水中胆红素含量比正常明显减少 E.妊娠周数越近足月，胎儿存活率越高

15. 功能性子宫出血的检查不包括以下哪项? A.诊断性刮宫 B.腹腔镜检查 C.宫腔镜检查 D.基础

体温测定 E.激素测定 16. 关于卵巢功能检查，下列哪项是正确的? A. 在排卵期进行子宫内膜活检，了解有无排卵 B. 腹腔镜检查有无卵巢囊肿 C. 月经干净后检查宫颈粘液有无椭圆体 D. 基础体温测定了解有无排卵及黄体功能 E. 垂体兴奋试验观察卵巢有无反应 17. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是 A.早婚早育，性生活紊乱 B.高血压，糖尿病，肥胖 C.雌激素水平增高 D.饮食因素 E.环境因素 18. 子宫内膜异位症的主要病理变化，下列哪项是错误的? A.异位内膜随卵巢激素的变化而发生周期性出血 B.病变伴有周围纤维组织增生和粘连形成 C.病变的浆膜面可见粟粒结节 D.病变区出现紫褐色斑点或小泡 E.可发展为紫蓝色包块 19. 关于子宫脱垂，下述哪项错误? A.盆腔内巨大肿瘤或大量腹水，可迫使子宫向下移位 B.不可能发生于未产妇及处女 C.与第二产程延长、阴道手术助产有关 D.与慢性咳嗽、长期便秘有关 E.与雌激素低落、盆底组织松弛有关 20. 关于子宫破裂，下列哪项是正确的? A. 子宫下段剖宫产瘢痕较古典式剖宫产易破 B. 病理缩复环高达平脐应考虑先兆子宫破裂 C. 阴道分娩时易发生下段破裂 D. 子宫破裂时应迅速从阴道娩出胎儿 E. 有血尿即可诊断子宫破裂

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com