

执业医师《妇产科学》辅导：卵巢颗粒细胞瘤临床表现 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16281.htm 大约有3%左右的颗粒细胞瘤无明显症状，于偶然被发现。绝大部分病人临床均有症状，主要为内分泌紊乱及腹部包块引起。（1）雌激素刺激症状：由于肿瘤细胞可以分泌雌激素，若肿瘤发生在青春期前，多数表现为性早熟。此类性早熟为肿瘤刺激引起，并非真性早熟，又称假性性早熟。临床可出现乳房增大、阴阜发育、阴毛腋毛生长、内外生殖器等异常发育，甚至出现无排卵性月经。另有的出现身高、骨龄过度超前发育，而精神及思想发育不同步的不协调症状。肿瘤发生于绝经后妇女，绝经后出血是典型的临床症状，还会出现乳房胀、乳房增大，阴道涂片鳞状上皮成熟指数右移等表现。在此年龄组病人中，发生子宫内膜增生性病变、癌前病变及癌的机率较育龄组妇女为高。合并子宫内膜癌的患者，年龄多在50岁以上。

（2）男性化征象：由于卵巢间质发生黄素化及卵泡内膜细胞黄素化，少数患者出现月经稀发、闭经、多毛、阴蒂长大、面部痤疮、声音低哑等男性化现象。这些症状常常医学教育网原创发生在患有囊性颗粒细胞瘤的患者。（3）腹部包块：卵巢颗粒细胞瘤平均直径12cm左右，一般为中等大小，于妇科盆腔检查中可以摸到，而于腹部不容易触及。若患者自己扪到下腹包块，并以此为主诉就诊，其肿瘤往往已较大。若伴有腹水，可有腹胀、饱满感、排尿困难等其他症状。当肿瘤生长快，包膜破裂或肿瘤发生扭转时，常出现有急剧的腹痛症状。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com