

执业医师《妇产科学》辅导：骨盆出口平面狭窄分级 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16284.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16284.htm) 根据坐骨结节间径及坐骨结节间径与骨盆出口后矢状径之和数值不同，将骨盆出口狭窄分3级：  
Ⅰ级为临界性狭窄，坐骨结节间径7.5cm，坐骨结节间径与出口后矢状径之和15.0cm；  
Ⅱ级为相对性狭窄，坐骨结节间径6.0-7.0cm，坐骨结节间径与出口后矢状径之和12.0-14.0cm；  
Ⅲ级为绝对性狭窄，坐骨结节间径≤5.5cm，坐骨结节间径与出口后矢状径之和≤11.0cm。  
。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)