

执业医师《内科学》辅导：有高血压合并症的11点选药注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16326.htm 合并心力衰竭，选ACEI、利尿剂，不选 受体阻滞剂。合并肾功能不全者可选钙拮抗剂、ACEI、甲基多巴，不宜选噻嗪类。合并冠心病、心绞痛者应选 受体阻滞剂或钙拮抗剂。合并脑卒中，不宜选中枢性降压药。老年人收缩期高血压，选利尿剂、长效二氢吡啶类钙拮抗剂 有高血脂、糖尿病、痛风者不宜用利尿剂或 受体阻滞剂，以免血糖、血脂和尿酸升高。可选用 1 受体阻滞剂。伴妊娠者，不宜用ACEI和AT1拮抗剂，可选用甲基多巴。合并抑郁症、支气管哮喘，不宜选用 受体阻滞剂。心脏传导阻滞者，不宜用 受体阻滞剂及非二氢吡啶类钙拮抗剂。心率较快者可用 受体阻滞剂 前列腺肥大者可加用 受体阻滞剂。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com