

执业助理模拟考题第一套（第四单元）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_16374.htm 每一道考题下面有A

- 、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。
1. 下列哪一种葡萄胎刮宫后非常规随访的项目？A．定期妇科检查 B．2年内指导避孕 C．定期作HCG定量测定 D．定期做阴道细胞涂片 E．定期B超及X线胸片检查
 2. 正常产褥期为产后 A．2～3周 B．4～5周 C．6～8周 D．9～12周 E．13～16周
 3. 葡萄胎的随访时间应为 A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年 E．3年
 4. 避孕与防止性传播疾病最好的措施为哪一项？A．皮下埋植药物 B．IUD C．阴道隔膜加杀精药 D．安全期避孕法 E．避孕套加避孕药膏
 5. 子宫内膜异位症的主要病理变化，下列哪项是错误的 A．异位内膜随卵巢激素的变化而发生周期性出血 B．病变伴有周围纤维组织增生和粘连形成 C．病变的浆膜面可见粟粒结节 D．病变区出现紫褐色斑点或小泡 E．可发展为紫蓝色包块
 6. 关于子宫脱垂，下述哪项错误 A. 盆腔内巨大肿瘤或大量腹水，可迫使子宫向下移位 B．不可能发生于未产妇及处女 C．与第二产程延长、阴道手术助产有关 D．与慢性咳嗽、长期便秘有关 E．与雌激素低落、盆底组织松弛有关
 7. 关于子宫破裂，下列哪项是正确的 A．子宫下段剖宫产瘢痕较古典式剖宫产易破 B．病理缩复环高达平脐应考虑先兆子宫破裂 C．阴道分娩时易发生下段破裂 D．子宫破裂时应迅速从阴道娩出胎儿 E．有血尿即可诊断子宫破裂
 8. 闭经治疗以下哪项是错误的 A．全身治疗 B．病因治疗 C．性激素治疗 D．诱导排卵 E．卵巢大剂量放射治疗
 - 9.

枕先露临产：后肛查了解胎头下降程度的标志为 A．骶岬 B．耻骨联合后面 C．坐骨棘 D．坐骨结节 E．坐骨切迹

10. 发生尿瘘最常见的原因是 A．产伤及妇科手术损伤 B．长期安放子宫托 C．放射性损伤 D．阴道内放腐蚀性药物 E．膀胱病变

11. 无排卵性功能失调性子宫出血的原因是 A．卵巢功能早期衰竭 B．垂体肿瘤 C．促性腺激素或卵巢激素在释出或平衡方面的暂时性变化 D．生殖道炎症 E．性激素类药物使用不当

12. 关于幼女性阴道炎，哪项错误 A．缺乏雌激素，阴道上皮抵抗力低，易受感染 B．常见病原体为葡萄球菌、链球菌及大肠杆菌 C．高锰酸钾溶液冲洗阴道是有效的治疗 D．幼女阴道炎可因接触污物或异物误入阴道内引起 E．蛲虫感染也可引起炎症

13. 关于女性外生殖器解剖，哪项正确 A．阴阜为耻骨前面的脂肪垫，长有阴毛，呈尖端向上的三角形 B．大阴唇外侧面与皮肤相同，内侧面似粘膜，富有皮脂腺和汗腺 C．阴蒂相当于男子的球海绵体 D．前庭大腺开口于小阴唇与处女膜间的沟内 E．尿道旁腺位于尿道口两侧，常为细菌潜伏所在

14. 下列哪些不是卵巢良性肿瘤的并发症 A．生长迅速 B．蒂扭转 C．恶变 D．破裂 E．感染

15. 卵巢畸胎瘤最常见的并发症为 A．腹水 B．蒂扭转 C．恶变 D．破裂 E．感染

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com