

执业医师《外科学》辅导：关于静脉尿路造影 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16415.htm

静脉尿路造影，我们简称为IVP，系经静脉注入20ml造影剂、由肾脏排泄至尿路而使整个泌尿系显影的一种检查方法，其过程有：碘过敏试验、静脉注射造影剂、压腹带、摄取不同时段造影片等几个步骤，全过程通常在半小时完成。静脉尿路造影的适应症有哪些？

泌尿系结石。泌尿系结核、肿瘤、囊肿、先天性畸形和慢性炎症。原因不明的血尿及脓尿。需了解损伤程度和范围的尿路损伤。腹膜后肿瘤的鉴别诊断等。

怎样预约造影及造影前应做的准备 由临床科医生开造影申请单，患者持申请单到放射科登记室定价、在收费处缴费后（住院患者上述手续由住院科室办理）再到放射科登记室预约造影时间，并开出预约单，医学教育网原创预约单详细注明了造影时间及造影前的各项准备事宜。造影前应做的准备 患者应仔细阅读预约单，明确造影检查时间。检查前晚餐进半流饮食，即（粥、粉、面）。晚餐后服下轻泻剂（50%硫酸镁30ml），再饮500ml以上的水。检查当日携预约单到登记室插单，我们将根据您的插单先后安排检查顺序，早到者先做。造影中应如何配合 碘过敏试验及注射造影剂时，如有不适感要及时告知为您试敏的医生。造影过程中的每一次摄片要遵医嘱，屏住呼吸，以防影像模糊。检查完成后，请不要立即离开，暂不要排尿，在检查室外坐等20分钟再行离开进食。一小时后在登记室取造影结果。静脉尿路造影（IVP）是通过静脉注射造影剂（安其格那芬）使肾、输尿管和膀胱

显影而达到诊断目的的一种检查方式，是泌尿外科、妇科等常用的检查方法，其特点是痛苦小、诊断效率高，特别是对于泌尿系统结石和泌尿系统排泄功能有着权威的诊断目的。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com