

执业医师《妇产科学》辅导：中、晚期妊娠的诊断 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_16432.htm (一) 症状及体征 经历早期妊娠的经过，逐渐感到腹部增大和觉胎动。 1.子宫增大 子宫随妊娠进展逐渐增大，根据手测宫底高工及尺测耻上子宫长度，可以判断妊娠周数。 2.胎动 胎儿在子宫内的活动称胎动 (fetal movement , FM) ，是妊娠诊断依据，也是胎儿宫内安危的重要指标。若胎动 30次/12小时或4次/小时为正常；若连续2日胎动 3次/小时，则为异常。 3.胎儿心音 于妊娠10周应用Doppler可听到胎心音，18 ~ 20周用听诊器经孕妇腹壁能听到胎心音。正常胎心率在120 ~ 160bpm， < 120bpm 或 > 160bpm表示胎心率异常。 4.胎体 于妊娠20周以后，经腹壁可触到子宫内的胎体。 (二) 辅助检查 1.超声检查 一般在妊娠18 ~ 20周应作胎儿畸形筛选超声。 2.胎儿心电图 胎儿心电图 (fetal electrocardiography , FECG) 可反应胎儿心脏的活动情况。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com