

执业医师《内科学》辅导：霍奇金病的分期标准及治疗方案
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16445.htm

问题：女，右颈及锁骨上淋巴结肿大，无痛，无发热，有粘连，一月来面部及上胸部浮肿，颈粗。HB90，WBC 10×10^9 ，中性0.66，淋巴0.24，活检见R-S细胞，胸片示纵隔肿块，请问选择分期和治疗方案？

解析：患者属 A期，治疗采用扩大照射；膈上用斗篷式。目前国内广泛采用的恶性淋巴瘤分期标准是1966年Ann Arbor会议对霍奇金病的分期标准（NHL也参照使用）进行临床分期和分组。

期：病变仅限于一个淋巴结区（ ），或单个结外器官局部受累（ E）。来源：www.examda.com
期：病变累及膈同侧2个或更多个淋巴结区（ ），或病变局限侵犯淋巴结以外器官或膈同侧一个以上淋巴区（ E）。

期：膈上下均有淋巴结病变（ ），可伴有脾累及（ S），结外器官局部受限（ E），或脾与局限性结外器官受累（ SE）。
期：一个或多个结外器官受到广泛性或播散性侵犯，伴或不伴淋巴结肿大。肝或骨髓受到累及均属于 期。

分期记录符号：E：结外；X：直径10cm以上的巨块；M：骨髓；S：脾脏；H：肝脏；O：骨骼；D：皮肤；P：胸膜；L：肺。每期按有无症状再分为A和B两组。A组无症状；B组有症状。

全身症状包括三方面：来源：www.examda.com
1、发热 38°C 以上，连续3天以上，且无感染。
2、6个月内体重减轻10%。
3、盗汗，即入睡后出汗。

治疗方案
1、 A、 A：扩大照射；膈上用斗篷式，膈下用倒“Y”字式
2、 B、 B：联合化疗 局部照射
来源：www.examda.com
转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com