

执业医师《内科学》辅导：二尖瓣脱垂的杂音 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16461.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16461.htm)

问题：女,25岁,经常胸闷心悸,经体检诊断为二尖瓣脱垂,其体征应具有下列哪项 A.第一心音亢进 B.开瓣音 C.收缩早期喷射音 D.心尖区舒张期杂音 E.收缩中晚期喀嚓音 请解释为什么？ 答案及解析：本题

选E。二尖瓣脱垂时以收缩中晚期杂音伴有喀嚓音为主。第一心音亢进、开瓣音、海鸥鸣等也有，但不是主要的。二尖瓣脱垂时一般二尖瓣关闭不全较轻，多数无症状，或仅有心悸、乏力、体位性昏厥等症状；严重二尖瓣反流晚期出现左心衰竭。由于瓣叶或过多过长腱索的张力异常，以收缩中晚期杂音伴有喀嚓音为主。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)