

执业医师《外科学》辅导：结、直肠癌的临床表现及诊断

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16513.htm 概述 结、直肠癌

(carcinoma of colon and rectum) 是常见的恶性肿瘤，据2001年中国卫生事业发展情况统计公告，结、直肠癌发病详细在我国位于恶性肿瘤的第三位，死亡率10.25/10万，位于恶性肿瘤致死原因的第五位。流行病学方面，中国人结、直肠癌与西方人比较有三个特点： 直肠癌比结肠癌发病率高，约1.5-2：1。 低位直肠癌中所占比例高，约占70%，大多数直肠癌可在进肠指诊时触及。 青年人（但近几十年来，随着人民生活水平的提高及饮食结构的改变，结肠癌比例亦逐渐增多。直肠癌的发病率比较稳定，而结肠癌的发病率上升较快。结肠癌根治性切除术后5年生存一般为60%~80%之间，直肠癌约为50%~70%。DukesA期病人根治性切除术后的5年生存率可达90%以上，而D期的病人小于5%。临床表现 结、直肠癌早期无明显症状，肿瘤生长到一定程度，依期生长部位不同而有不同的临床表现。 1.右半结肠癌的临床表现 (1) 腹痛：右半结肠癌约有70%~80%病人有腹痛，多为隐痛。(2) 贫血：因癌灶的坏死、脱落、慢性失血而引起，约有50%~60%的病人血红蛋白低于10g/L。(3) 腹部肿块：腹部肿块亦是右半结肠癌的常见症状。腹部肿块同时伴梗阴的病例临床上并不多见。 2.左半结肠癌的临床表现 (1) 便血、粘液血便：70%以上可出现便血或粘液血便。(2) 腹痛：约60%出现腹痛，腹痛可为隐痛，当出现梗阻表现时，亦可表现为腹部绞痛。(3) 腹部肿块：40%左右的病人可触及左下腹肿块

。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com