

执业医师《内科学》辅导：下肢动脉触诊法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16529.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16529.htm)

(1) 足背动脉：用左手轻握患者的足趾以免患足摆动。右手手指沿第一、二骨之间的沟向上移向踝关节，指腹偏向第一跖骨，一般可在这条线的近端伸长肌肌腱侧面扪到足背动脉搏动。正常人约

有8-10%足背动脉先天缺如。(2) 胫后动脉：搏动可在内踝后缘与跟腱内缘之间的中点处扪到。踝关节背屈并内翻时，搏动比较容易扪到。(3) 胫前动脉：在踝关节上方浅表处，其搏动可在两踝之间的中点扪到。

(4) 腓动脉：5%的病例的胫前动脉为腓动脉所代替。在外踝内侧约1cm处扪到。

(5) 动脉：膝关节中线深部，屈膝至直角然后深扪之。如用此法不能扪到搏动，可让病者俯卧并屈膝然后进行扪查。

(6) 股动脉：在腹股沟韧带下方髌前上棘与耻骨联合中点处，但需深扪。如不能扪及，则提示髂外动脉或髂总动脉闭塞；两侧股动脉均不能扪及者，提示腹主动脉闭塞。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)